

## 临床执业医师考试历年真题精华（三）

### 第 1 题 (单项选择题)

知识点：前列腺素

大鼠出生后饲以去脂饮食，结果将引起下列哪种脂质缺乏

- A.磷脂酰胆碱
- B.甘油三脂
- C.鞘磷脂
- D.胆固醇
- E.前列腺素

正确答案：E,

### 第 2 题 (单项选择题)

知识点：胃镜检查

确诊消化性溃疡首选的检查方法是

- A.B 超
- B. X 线
- C.幽门螺旋杆菌检测
- D.胃镜
- E.胃液分析

正确答案：D,

### 第 3 题 (单项选择题)

知识点：幽门螺旋杆菌

作为幽门螺旋杆菌根除治疗后复查的首选方法是

- A.胃组织学检查
- B.快速尿素酶试验
- C.幽门螺旋杆菌培养
- D.C14 尿素呼气试验
- E.血清学检查

正确答案：D,

第 4 题 (单项选择题)

知识点：消化性溃疡

引起上消化道出血最常见的原因是

- A.胃癌
- B.胃十二指肠溃疡
- C.肝硬化
- D.出血性胃炎
- E.胆道出血

正确答案：B,

第 5 题 (单项选择题)

知识点：消化性溃疡

下列哪项不符合由胃泌素瘤引起的消化性溃疡

- A.多发生在球后十二指肠降部和横段,或空肠近端
- B.常规胃手术后不易复发
- C.易并发出血、穿孔、梗阻
- D.基础胃酸分泌过度
- E.常伴腹泻

正确答案：B,

第 6 题 (单项选择题)

知识点：缺铁性贫血

下列疾病中，骨髓有核红细胞出现“核老浆幼”现象的是

- A.巨幼红细胞性贫血
- B.急性红血病
- C.缺铁性贫血
- D.骨髓增生异常综合症
- E.再障

正确答案：C,

第 7 题 (单项选择题)

知识点：结肠癌

结肠癌患者中血清 CEA 水平高于正常的约占

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%
- E. 70%

正确答案: D,

第 8 题 (单项选择题)

知识点: 低蛋白血症

肾病综合症预防性抗凝治疗的指征是

- A. 出现尿频尿急尿痛
- B. 出现血尿
- C. 出现蛋白尿
- D. 血浆蛋白<20g/l
- E. 出现水肿

正确答案: D,

第 9 题 (单项选择题)

知识点: 肾小球性蛋白尿尿蛋白主要为白蛋白的为

- A. 肾小管性蛋白尿
- B. 溢出性蛋白尿
- C. 肾小球性蛋白尿
- D. 分泌性蛋白尿
- E. 组织性蛋白尿

正确答案: C,

第 10 题 (单项选择题)

知识点: 免疫反应

慢性排斥反应中，移植物的血管病变特点是

- A. 血管内膜纤维化
- B. 血管肌层肥厚

- C.血管外膜纤维组织增生
- D.血管壁纤维性坏死
- E.血管壁玻璃样变性

正确答案: A,

第 11 题 (单项选择题)

知识点: 大肠杆菌

继发性腹膜炎最常见的病原菌是

- A.链球菌
- B.葡萄球菌
- C.变形杆菌
- D.大肠杆菌
- E.厌氧菌

正确答案: D,

第 12 题 (单项选择题)

知识点: 尿路结石

X 线平片绝大多数能显影的结石是

- A.胆囊结石
- B.肝内胆管结石
- C.肝外胆管结石
- D.尿路结石
- E.胆总管结石

正确答案: D,

第 13 题 (单项选择题)

膀胱癌的类型

膀胱癌最常见的组织类型是

- A.鳞癌
- B.腺癌
- C.移行细胞癌

D.透明细胞癌

E.乳头状癌

正确答案：C,

第 14 题 (单项选择题)

知识点：前列腺增生前列腺增生最重要的症状

A.尿频

B.尿急

C.尿痛

D.尿潴留

E.进行性排尿困难

正确答案：E,

第 15 题 (单项选择题)

知识点：泌尿系肿瘤泌尿系肿瘤中最常见的是

A.膀胱癌

B.肾细胞癌

C.肾盂癌

D.前列腺癌

正确答案：A,

第 16 题 (单项选择题)

知识点：泌尿系感染

尿路感染诊断的最重要依据是

A.有尿频、尿急、尿痛症状

B.腰痛和肾区叩痛

C.有真性细菌尿

D.有白细胞尿

E.有蛋白管型

正确答案：C,

第 17 题 (单项选择题)

知识点：肾盂结石

静息状态下，可无明显临床表现的结石是

- A.输尿管结石
- B.膀胱结石
- C.尿路结石
- D.肾盂结石
- E.胆囊结石

正确答案：D,

第 18 题 (单项选择题)

知识点：贫血

下列哪一种贫血是由于红细胞破坏过多引起的

- A.ITP
- B.缺铁性贫血
- C. PNH
- D.再障
- E.遗传性球形细胞增多症

正确答案：E,

第 19 题 (单项选择题)

知识点：铁的吸收部位是

- A.回肠
- B.十二指肠及空肠上段
- C.胃
- D.结肠
- E.直肠

正确答案：B,

第 20 题 (单项选择题)

知识点：血液骨髓极检查

鉴别再障和白细胞不增多性白血病最重要的检查是

- A.血小板计数
- B.周围血找幼稚白细胞

C.周围血找红细胞

D.骨髓细胞学检查

E.网织红细胞计数

正确答案：D,

第 21 题 (单项选择题)

知识点：溶血性贫血进行脾切除最有价值的是

A.海洋性贫血

B. PNH

C.糖皮质激素治疗无效的原发性自身免疫性溶血性贫血

D.遗传性球形细胞增多症

E.再障

正确答案：D,

第 22 题 (单项选择题)

知识点：严重慢性心肺疾病

左心功能不全、肺循环淤血的主要临床表现，下列哪项不正确

A.咳嗽、咳痰，痰为浆液性，呈白色泡沫状

B.劳力性呼吸困难，休息即缓解

C.肺微小动脉压增高，血浆外渗，痰带血性

D.阵发性夜间呼吸困难

E.支气管痉挛，发作性哮喘

正确答案：C,

第 23 题 (单项选择题)

知识点：输血

输血可传播下列哪一种疾病

A.结核

B.伤寒

C.疟疾

D.钩虫病

E.甲型肝炎

正确答案： C,

第 24 题 (单项选择题)

知识点：胰高血糖素由胰岛 A 细胞分泌的激素是

- A.胰岛素
- B.胰高血糖素
- C.生长抑素
- D.血管活性肠肽
- E.胰多肽

正确答案： B,

第 25 题 (单项选择题)

尿量增多原因

下列属于由内分泌疾病而引起尿量增多的原因是

- A.摄水过多
- B.急性肾衰多尿期
- C.应用利尿剂
- D.中枢性尿崩症
- E.慢性肾盂肾炎

正确答案： D,

第 26 题 (单项选择题)

知识点：儿茶酚胺

下列氨基酸中能转化为儿茶酚胺的是

- A.天冬氨酸
- B.色氨酸
- C.酪氨酸
- D.缬氨酸
- E.甲硫氨酸

正确答案： C,

第 27 题 (单项选择题)

知识点：心脑血管疾病

有关高血压并发症,下列哪项不正确

- A.心、脑、肾等器官是主要受累脏器
- B.眼底病变与高血压的严重程度直接有关
- C.恶性高血压以脑并发症最为突出
- D.脑卒中的发病率比心肌梗死高 5 倍左右
- E.高血压脑病症状出现可能与脑水肿有关

正确答案: C,

第 28 题 (单项选择题)

知识点: 氧解离曲线

下列哪种情况下氧解离曲线右移

- A.肺通气阻力减少
- B.代谢性碱中毒
- C.2,3-二磷酸甘油增多
- D.体温降低
- E.血二氧化碳分压下降

正确答案: C,

第 29 题 (单项选择题)

知识点: 甲状腺癌最常见的甲状腺癌

- A.乳头状腺癌
- B.滤泡状腺癌
- C.未分化癌
- D.髓样癌
- E.转移癌

正确答案: A,

第 30 题 (单项选择题)

知识点: Babinski 征

下列表现属于 Babinski 征的是

- A.四指轻度掌屈
- B.拇指背伸,余趾扇形展开

- C.屈颈检查抵抗力增强
- D.伸膝受阻伴疼痛
- E.头屈曲时,双髋及膝关节同时屈曲

正确答案：B,

第 31 题 (单项选择题)

知识点：瘫痪

符合中枢性瘫痪的临床特征是

- A.肌群瘫痪为主
- B.有肌萎缩
- C.肌张力增高
- D.腱反射消失
- E.无病理反射

正确答案：C,

第 32 题 (单项选择题)

知识点：颅脑损伤

重型颅脑损伤常见的致命性并发症

- A.压疮
- B.消化道出血
- C.角膜溃疡
- D.尿路感染
- E.肺炎

正确答案：E,

第 33 题 (单项选择题)

知识点：颅脑病变

下列不属于枕骨大孔疝的常见症状是

- A.剧烈头痛、呕吐
- B.颈项强直
- C.早期出现一侧瞳孔散大
- D.意识障碍

E.呼吸骤停发生早

正确答案： C,

第 34 题 (单项选择题)

知识点： 脑部病变

高血压性脑出血最好发的部位是

A.脑室

B.内囊和基底节附近

C.丘脑

D.脑桥

E.小脑

正确答案： B,

第 35 题 (单项选择题)

知识点： 颅脑病变

颅内占位病变最安全可靠易行的辅助检查方法是

A.颅脑超声探测

B.脑血管造影

C.头颅 CT

D.透露 X 线平片

E.放射性核素扫描

正确答案： C,

第 36 题 (单项选择题)

知识点： 颅骨损伤

颅脑对冲伤最常见的部位是

A.枕叶

B.额颞叶

C.小脑

D.顶叶

E.脑干

正确答案： B,

第 37 题 (单项选择题)

知识点：蛛网膜下腔出血

以下治疗蛛网膜下腔出血的措施不妥的是

- A.卧床休息 4-6 周
- B.应用止血药物
- C.低分子肝素注射
- D.静滴 20% 甘露醇
- E.口服尼莫地平

正确答案： C,

第 38 题 (单项选择题)

知识点：精神病症状学

患者将地上的草绳看成一条大蛇,这种表现是

- A.感觉过敏
- B.象征性思维
- C.关系妄想
- D.幻觉
- E.错觉

正确答案： E,

第 39 题 (单项选择题)

知识点：谵妄

谵妄时最多见的幻觉是

- A.听幻觉
- B.视幻觉
- C.味幻觉
- D.触幻觉
- E.嗅幻觉

正确答案： B,

第 40 题 (单项选择题)

知识点：粒细胞

再障的诊断，下列哪一项不正确

- A.发热、出血、贫血
- B.一般无肝脾和淋巴结肿大
- C.中性粒细胞碱性磷酸酶阳性率和积分减低
- D.骨髓可呈灶性增生，但巨核细胞减少
- E.末梢血淋巴细胞比例增高

正确答案：C，

第 41 题 (单项选择题)

知识点：精神分裂症青春型精神分裂症的特征是：

- A.明显的精神运动紊乱和木僵交替为主
- B.阴性症状为主，注意减弱
- C.偏执性妄想
- D.精神活动的全面紊乱和瓦解
- E.持续存在阴性症状或某些个别的阳性症状，意志减退

正确答案：D，

第 42 题 (单项选择题)

知识点：碳酸锂

下列选项属于碳酸锂的不良反应的是

- A.引起瞳孔增大
- B.引起呼吸抑制
- C.引起共济失调
- D.引起急性呼吸衰竭
- E.引起周围神经炎

正确答案：C，

第 43 题 (单项选择题)

知识点：解毒

敌百虫中毒者洗胃禁用

- A.1:5000 高锰酸钾
- B.2%碳酸氢钠

C. 0.3%过氧化氢

D. 0.3%氧化镁

E. 5%碳酸钠

正确答案：B,

第 44 题 (单项选择题)

知识点：颈部肿瘤

女，59岁，右颈部淋巴结肿大3个月，蚕豆大小，其可能性最小的病变是

A.转移癌

B.淋巴结反应性增生

C.恶性淋巴瘤

D.淋巴结核

E.转移性肉瘤

正确答案：E,

第 45 题 (单项选择题)

知识点：无菌术

术中的无菌原则，下列哪项是错误的

A.碘酒、酒精涂擦皮肤应包括手术切口周围15cm

B.同侧手术人员换位，一人应先退一步，然后平移换位

C.铺巾顺序：先铺操作者对面或铺相对不洁区，最后铺靠近操作者的一侧

D.手术巾放置不准确时只能由手术区向外移不应向内移

E.大单头端应盖过麻醉架，两侧和足端应垂下超过手术床边30cm

正确答案：B,

第 46 题 (单项选择题)

知识点：感染示指腱鞘炎易蔓延至

A.掌中间隙

B.鱼际间隙

C.桡侧滑液囊

D.尺侧滑液囊

E.中指骨膜下间隙

正确答案：B，

第 47 题 (单项选择题)

知识点：破伤风

在破伤风的治疗措施中,下列哪项是关键

- A.彻底清创, 引流伤口, 消除毒素来源
- B.使用破伤风抗毒素中和游离的毒素
- C.控制和解除痉挛, 预防窒息
- D.给予大量青霉素, 控制破伤风杆菌
- E.积极支持治疗

正确答案：C，

第 48 题 (单项选择题)

知识点：高血压

高血压时的肾脏病理变化表现为

- A.颗粒型固缩肾
- B.肾脏单发性贫血性梗死
- C.肾动脉动脉瘤形成
- D.肾的多发性大瘢痕形成
- E.肾脏淤血

正确答案：A，

第 49 题 (单项选择题)

知识点：降压药

高血压合并糖尿病,血肌酐正常, 选用下列哪类降压药最合适

- A.血管紧张素转化酶抑制剂
- B.利尿剂
- C. B 受体阻滞剂
- D.钙离子拮抗剂
- E. a 受体阻滞剂

正确答案：A，

第 50 题 (单项选择题)

知识点：慢性肾炎

女,30岁,1年来乏力,易疲倦,腰部不适,有时下肢浮肿,未检查。2个月来加重,伴纳差,血压增高为150/100mmHg,下肢轻度浮肿。尿蛋白(+),沉渣EBC5-10/HP,偶见颗粒管型,血化验Hb90g/l,血肌酐400ug/l。最可能的诊断是

- A.慢性肾盂肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.肾病这孩子
- D.狼疮肾炎
- E.急性肾炎

正确答案：B,

第 51 题 (单项选择题)

知识点：特发性肺间质纤维化

男,67岁,慢性咳嗽,咳少量白痰,活动后气短3年,近2月气短加重,痰量较多,为脓性痰。查体:口唇轻度紫绀,双下肺可闻及Velcro音,有杵状指。根据以上病史,症状和体征特点,对该患者最可能的诊断是

- A.淋巴样间质性肺炎
- B.特发性肺间质纤维化
- C.巨细胞型间质性肺炎
- D.慢阻肺
- E.支气管哮喘

正确答案：B,

第 52 题 (单项选择题)

知识点：新月性肾炎

肾球囊壁层上皮细胞增生是哪类肾小球疾病的病理表现

- A.新月体肾炎
- B.急性肾炎
- C.膜性肾病
- D.脂性肾病
- E.膜增生性肾小球肾炎

正确答案：A,

第 53 题 (单项选择题)

知识点：肾小球肾炎

下列哪一项不支持急进性肾小球肾炎的诊断

- A. 呈急性肾炎综合症
- B. 肾功能急剧转坏
- C. 早期出现少尿性急性肾功能衰竭
- D. 数周至半年进展至尿毒症
- E. 常无贫血表现

正确答案：E,

第 54 题 (单项选择题)

知识点：尿感

尿培养的球菌菌落计数不低于多少才有诊断意义

- A. 100/mL
- B. 300/mL
- C. 500/mL
- D. 1000/mL
- E. 10000/mL

正确答案：D,

第 55 题 (单项选择题)

知识点：肾挫伤

患者，男，35岁，左腰部受伤后出现腰痛。体检：血压 U5/90mmHg，P80 次/分，左肾区叩痛，腹膜刺激征（-）。尿常规检查：HBC5-10 个/HP。该患者最可能的诊断是

- A. 肾部分裂伤
- B. 肾全层裂伤
- C. 肾蒂损伤
- D. 肾挫伤
- E. 自发性肾破裂

正确答案：D,

第 56 题 (单项选择题)

知识点：交通性鞘膜积液

患者，男，15岁，阴囊内肿块，每日起床或站立后肿块缓慢增大，平卧位缩小。透光试验阳性。最可能的诊断为

- A.交通性鞘膜积液
- B.睾丸鞘膜积液
- C.隐睾
- D.精索鞘膜积液
- E.急性肠梗阻

正确答案：A,

第 57 题 (单项选择题)

知识点：膀胱结石

表现为排尿突然中断的疾病是

- A.尿道结石
- B.肾结石
- C.膀胱结石
- D.前列腺增生
- E.肾癌

正确答案：C,

第 58 题 (单项选择题)

溶血性贫血

属于红细胞周围环境异常所致的溶血性贫血的是

- A.遗传性球形细胞增多症
- B. PNH
- C.自身免疫性溶血性贫血
- D.海洋性贫血
- E.血红蛋白病 S

正确答案：C,

第 59 题 (单项选择题)

知识点：急性淋巴细胞白血病

下列各种类型急性白血病中，哪一类最常发生中枢神经系统白血病

- A. 急性粒细胞白血病
- B. 急性单核细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 急性粒单核细胞性白血病
- E. 红白血病

正确答案：C,

第 60 题 (单项选择题)

知识点：HL 的治疗

目前 HL 的首选化疗方法是

- A. CHOP 方案
- B. COP 方案
- C. HA 方案
- D. ABVD 方案
- E. DVLP 方案

正确答案：D,

第 61 题 (单项选择题)

知识点：小细胞低色素性贫血可见于

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血
- C. 骨髓增生异常综合症
- D. 再障
- E. 溶血性贫血

正确答案：A,

第 62 题 (单项选择题)

知识点：洗涤红细胞

去除白细胞和血小板、肝炎病毒和抗 A、B 抗体的红细胞属于

- A. 农缩红细胞

- B.洗涤红细胞
- C.冰冻红细胞
- D. LPRBC
- E.冷沉淀

正确答案：B,

第 63 题 (单项选择题)

知识点：溶血性输血反应

成年患者,输血 100mL 后, 突然寒战、高热, 恶心呕吐, 头痛心悸, 剧烈腰痛, 血压下降等, 可诊断为

- A.发热反应
- B.过敏反应
- C.细菌污染反应
- D.溶血反应
- E.循环超负荷

正确答案：D,

第 64 题 (单项选择题)

知识点：浓缩红细胞

健康成人, 若失血量达 1000mL, 应输注

- A.洗涤红细胞
- B.浓缩白细胞
- C.血小板制剂
- D.浓缩红细胞
- E.冰冻红细胞

正确答案：D,

第 65 题 (单项选择题)

知识点：原发性醛固酮增多症

患者, 男, 40 岁, 发现血压高半年, 最高达 150/100mmHg, 伴乏力, 肌痛, 口渴。吸烟 20 年。查体: 血压 170/100mmHg, 肥胖, 心脏不大, 心律整齐, 心率口 6 次/分, 双下肢不肿。尿常规: 尿蛋白(+), 比重 1.018, 血钾 3.1mmol/L。最可能的诊断是

- A.原发性醛固酮增多症
- B.原发性高血压
- C.肾性高血压
- D.肾血管性高血压
- E.嗜铬细胞瘤

正确答案：A,

第 66 题 (单项选择题)

知识点：激素

患者长期大量使用糖皮质激素时，下列哪种变化正确

- A.血中促肾上腺皮质激素减少
- B.血中肾上腺皮质激素增加
- C.血中 TSH 增加
- D.血中 GH 减少
- E.血中 PRL 增加

正确答案：E,

第 67 题 (单项选择题)

知识点：糖尿病

糖尿病毛细血管间肾小球肾炎硬化症在临幊上尿液变化的主要特点是

- A.尿糖较前增多
- B.大量血尿
- C.尿中有大量白细胞及管型
- D.持续性蛋白尿
- E.出现酮体

正确答案：D,

第 68 题 (单项选择题)

知识点：低钙血症

急性肾功能衰竭少尿期的表现正确的是

- A.低钾
- B.高氯

- C.高钠
- D.低钙
- E.低镁

正确答案： D,

第 69 题 (单项选择题)

知识点：甲状腺大部分切除术关于甲亢手术治疗，下列哪项正确

- A.通常需切除双侧甲状腺腺体的 60% -70%.
- B.处理甲状腺上极血管时应远离甲状腺上极
- C.结扎甲状腺下动脉要尽量离开腺体背面靠近颈总动脉
- D.甲状腺峡部要保留
- E.止血充分时，术野可不放置引流

正确答案： C,

第 70 题 (单项选择题)

知识点： 补液

瘢痕性幽门梗阻病人术前纠正体液代谢和酸碱失衡时,选用的液体是

- A. 1.25%碳酸氢钠液
- B. 1.25%碳酸氢钠液+5%葡萄糖液
- C. 5%葡萄糖液+l/6mmoL 乳酸钠液
- D.氯化钾+5%葡萄糖盐水
- E. l/6mmoL 乳酸钠液

正确答案： D,

第 71 题 (单项选择题)

知识点： 急性感染多发性神经炎

急性感染多发性神经炎的诊断标准之一是

- A.腱反射正常
- B.病后有腹泻
- C.起病即出现脑脊液中蛋白细胞分离现象
- D.四肢下运动神经元瘫
- E.双侧腓肠肌按痛

正确答案：D,

第 72 题 (单项选择题)

知识点：复方左旋多巴

老年帕金森患者的治疗最适当的治疗药物是

- A. 安坦
- B. 复方左旋多巴
- C. 司来吉兰
- D. 溴隐亭
- E. 维生素 E

正确答案：B,

第 73 题 (单项选择题)

知识点：脑缺血

下列哪项不符合脑缺血中的表现

- A. 多发生在 60 岁以上
- B. 多静态起病
- C. 多动态起病
- D. 意识障碍轻或无
- E. 脑脊液无色透明

正确答案：C,

第 74 题 (单项选择题)

知识点：血清钾

血钾浓度 6.5mmol/L，其首要处理措施是

- A. 静注 10% 葡萄糖酸钙
- B. 透析治疗
- C. 停止一切钾的摄入
- D. 快速补液
- E. 静注葡萄糖胰岛素液

正确答案：C,

第 75 题 (单项选择题)

知识点：低钾

低钾性碱中毒可能出现在下列哪种情况

- A.肾功能衰竭
- B.胃手术后
- C.术后少尿
- D.严重创伤
- E.大量输血

正确答案：B,

第 76 题 (单项选择题)

知识点：脑部疾病

男，65岁，平时有高血压、糖尿病多年。一天前发现左侧上、下肢活动受限，吐词不清，神志清楚。无明显头痛、呕吐，检查发现左侧上下肢肌力3级，左半身痛觉减退。临幊上考虑可能性最大的疾病是

- A.脑出血
- B.脑塞
- C.短暂性脑缺血发作
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑血栓形成

正确答案：E,

第 77 题 (单项选择题)

知识点：脑出血脑出血的诊断依据是

- A.争吵后头痛、呕吐
- B.偏瘫、偏盲、偏身感觉者
- C.急性偏瘫者，伴 CT 中对应区域有低密度灶
- D.急性偏瘫者，伴 CT 中对应区域有高密度灶
- E.持续昏迷者

正确答案：D,

第 78 题 (单项选择题)

知识点：抑郁症

诊断抑郁症的首要症状是

- A.精力明显减退、疲乏
- B.思维困难、联想缓慢
- C.情绪低落,兴趣下降
- D.自卑、自责、自杀观念
- E.失眠、早醒、体重减轻

正确答案: C,

第 79 题 (单项选择题)

知识点: 谛妄

关于谵妄病人, 说法正确的是

- A.会发生冲动行为但不会有自伤
- B.常有恐怖性的视幻觉但内容常模糊不清
- C.主要是意识范围障碍
- D.不会产生被害妄想
- E.突然变得安静, 说明病情可能加剧

正确答案: E,

第 80 题 (单项选择题)

知识点: 帕金森病

帕金森患者出现震颤麻痹是由于

- A.前庭小脑神经元病变所致
- B.红核神经元病变所致
- C.纹状体神经元病变所致
- D.多巴胺神经递质系统功能受损
- E.乙酰胆碱递质系统功能受损

正确答案: D,

第 81 题 (单项选择题)

知识点: 甲亢

甲状腺功能亢进患者中, 下列哪一项物质的浓度降低

- A.氨基酸

B.葡萄糖

C.胆固醇

D.血钙

E.尿酸

正确答案：C,

第 82 题 (单项选择题)

知识点：精神疾病

思维贫乏常见于

A.抑郁症

B.强迫性精神症

C.急性精神分裂症

D.慢性精神分裂症

E.癔症性精神病

正确答案：D,

第 83 题 (单项选择题)

知识点：精神疾病

精神分裂症的阳性症状不包括

A.第三人称幻听

B.影响妄想

C.思维破裂

D.情感淡漠

E.紧张型木僵

正确答案：D,

第 84 题 (单项选择题)

知识点：强迫症

表现为强迫性思维的是

A.抑郁症

B.急性精神分裂症

C.慢性精神分裂症

D.强迫性神经症

E.癔症性精神病

正确答案：D,

第 85 题 (单项选择题)

知识点：骨折

下列哪项不属于闭合性骨折切开复位内固定的适应症

A.骨折端间有软组织嵌插，手法复位失败

B.关节内骨折，手法复位对位不好

C.并发主要血管损伤

D.并发主要神经损伤

E.未达到解剖复位

正确答案：E,

第 86 题 (单项选择题)

知识点：骨折复位

外展内收型肱骨外科颈骨折的复位方法是

A.手法复位小夹板固定

B.三角巾悬吊

C.单纯手法复位

D.保守治疗

E.切开复位

正确答案：A,

第 87 题 (单项选择题)

知识点：抗休克治疗

关于休克的治疗原则，不正确的是

A.失血性休克的治疗首先以输注平衡盐溶液为主

B.感染性休克的治疗以处理原发感染灶、抗感染治疗为主

C.休克合并酸中毒时，不主张早期给予碱性药物纠酸

D.在充分容量复苏的前提下可给予血管活性药物

E.无论失血性休克或感染性休克，应首先纠正休克，再处理原发病

正确答案：B,

第 88 题 (单项选择题)

知识点：腰椎间盘突出症导致趾及足跖屈无力的是

- A.腰 4-腰 5 腰推间盘突出
- B.腰 3-腰 4 腰推间盘突出
- C.腰 1 -腰 2 腰推间盘突出
- D.腰 2-腰 3 腰推间盘突出
- E.腰 5 -骶 1 腰推间盘突出

正确答案：E,

第 89 题 (单项选择题)

知识点：非甾体抗炎药物

对胃、十二指肠黏膜损害最严重的药物是

- A.保泰松
- B.非甾体类抗炎药
- C.肝素
- D.消炎痛
- E.水杨酸

正确答案：B,

第 90 题 (单项选择题)

知识点：手术治疗

治疗胆囊结石，方法正确又效果确切的是

- A.药物溶石疗法
- B.体外震波碎石法
- C.经皮胆囊取石术
- D.胆囊切除术
- E.胆囊切除,胆总管探查引流术

正确答案：D,

第 91 题 (单项选择题)

知识点：腱鞘炎的蔓延

下列有关化脓性腱鞘炎的蔓延错误的是

- A.拇指腱鞘炎多蔓延引起桡侧滑囊炎
- B.小指腱鞘炎多蔓延引起尺侧滑囊炎
- C.中指、无名指腱鞘炎多蔓延引起掌中间隙感染
- D.示指腱鞘炎多蔓延引起桡侧滑囊炎
- E.示指腱鞘炎多蔓延引起鱼际间隙感染

正确答案：D,

第 92 题 (单项选择题)

知识点：胫神经股骨下 1/3 骨折可损伤

- A.股神经
- B.股动脉
- C.颈神经
- D.正中神经
- E.闭孔神经

正确答案：C,

第 93 题 (单项选择题)

知识点：化脓性关节炎的治疗

- 早期治疗化脓性髋关节化脓性炎最好的方法是
- A.合理有效抗生素加石膏固定
  - B.足量有效抗生素加支持治疗
  - C.足量有效抗生素加功能锻炼及理疗
  - D.足量有效抗生素加关节穿刺抽液并注入抗生素
  - E.切开引流，使用定量抗生素

正确答案：E,

第 94 题 (单项选择题)

知识点：软骨肉瘤的治疗软骨肉瘤采用的治疗方法是

- A.手术切除
- B.化疗
- C.放疗

D.化疗+根治性手术

E.放疗+根治性手术

正确答案： A,

第 95 题 (单项选择题)

知识点：局麻

下列选项中,不属于局麻的是

A.表面麻醉

B.局部浸润麻醉

C.区域麻醉

D.骶管麻醉

E.神经麻醉

正确答案： D,

第 96 题 (单项选择题)

知识点：肿瘤

下列哪个病变属于癌前病变

A.大肠腺瘤

B.皮下脂肪瘤

C.皮肤纤维瘤

D.子宫平滑肌瘤

E.乳腺纤维腺瘤

正确答案： A,

第 97 题 (单项选择题)

知识点：蛋白质合成

肝功能不良时，下列哪种蛋白质的合成受影响较小

A.清蛋白

B.凝血酶原

C.凝血因子 II、VIII 等

D.免疫球蛋白

E.纤维蛋白原

正确答案：D,

第 98 题 (单项选择题)

知识点：切口分类

下列表现属于 II/乙切口的是

- A. 清洁切口/愈合良好，无不良反应
- B. 清洁伤口/愈合处有炎症,但未化脓
- C. 可能污染切口/合处有炎症，但未化脓
- D. 可能污染切口/愈合良好，无不良反应
- E. 污染切口/切口已化脓，需切开引流

正确答案：C,

第 99 题 (单项选择题)

知识点：人体的基本营养代谢

卧床、无发热或异常消耗的成年男性病人每天最低热卡需求是

- A. 15-20kcal/(kg.d)
- B. 25-30kcal/(kg.d)
- C. 30-50kca]/(kg.d)
- D. 50-60 kcal/(kg.d)
- E. 75 kcal/(kg.d)

正确答案：B,

第 100 题 (单项选择题)

血培养的时间

对败血症的病人，抽血送培养的时间最好选择在

- A. 发热开始时
- B. 发热高峰时
- C. 寒战初起时
- D. 寒战发热时
- E. 寒战结束时

正确答案：D,

第 101 题 (单项选择题)

知识点：肾衰竭

脑出血引起肾衰竭的原因是

- A. 肾小球坏死
- B. 肾后性肾衰竭
- C. 急性肾小管坏死
- D. 肾性肾衰竭
- E. 肾中毒

正确答案：C,

第 102 题 (单项选择题)

知识点：肾衰竭

卵巢癌引起肾衰竭的原因是

- A. 肾后性急性肾衰竭
- B. 肾前性肾衰竭
- C. 肾性肾衰竭
- D. 卵巢性肾衰竭
- E. 多器官功能障碍

正确答案：A,

第 103 题 (单项选择题)

知识点：肾小球源性病

下列不属于肾小球源性病的主要临床表现的是

- A. 高血压

- B.水肿
- C.血尿
- D.蛋白尿
- E.颗粒管型

正确答案：E,

第 104 题 (单项选择题)

知识点：干啰音

以下是干啰音的特点。除了

- A.是呼吸音之外的附加声音
- B.呼气时明显
- C.持续时间较长
- D.性质和部位固定不变
- E.音调较高

正确答案：D,

第 105 题 (单项选择题)

知识点：咯血

不属于咯血特点的是

- A.出血前胸闷
- B.咳嗽后咯出鲜红色血
- C.鲜红色血中含泡沫痰
- D.鲜血经酸碱测定呈酸性

E.咯血后 3 天痰中仍带血

正确答案： D,

第 106 题 (单项选择题)

知识点： B 受体阻滞剂

B 受体阻滞剂的主要副作用是

A.咳嗽

B.血钾升高

C.高尿酸血症

D.诱发哮喘

E.血钠降低

正确答案： D,

第 107 题 (单项选择题)

知识点： 麻醉药

普鲁卡因穿透力较弱,不宜用于

A.浸润麻醉

B.传导麻醉

C.蛛网膜下腔麻醉

D.表面麻醉

E.硬膜外麻醉

正确答案： D,

第 108 题 (单项选择题)

知识点：感染

可直接引起感染性发热的是

- A. 血清病
- B. 心肌梗死
- C. 普通感冒
- D. 广泛性皮炎
- E. 大面积烧伤

正确答案：C,

第 109 题 (单项选择题)

知识点：致病菌

可能发展为慢性支气管炎急性发作的局部主要致病菌的是

- A. 奈瑟球菌
- B. 甲型链球菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 草绿色链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：C,

第 110 题 (单项选择题)

知识点：溃疡性结肠炎 溃疡性结肠炎的好发部位是

- A. 升结肠
- B. 空肠和回肠

C.直肠和乙状结肠

D.横结肠

E.回盲部

正确答案：C,

第 111 题 (单项选择题)

知识点：肾衰

急性肾衰少尿或无尿期最危险的是

A.水中毒、

B.血钠、血钙降低

C.高血钾

D.代谢性酸中毒

E.高血压

正确答案：C,

第 112 题 (单项选择题)

知识点：脑血栓

脑血栓形成发病的重要危险因素是

A.抽烟史

B.蛛网膜下腔出血史

C.脑出血史

D.短暂性脑出血发作史

E.梅毒史

正确答案：D,

第 113 题 (单项选择题)

知识点：抗精神病药物

判断抗精神病药物是否有效需足量使用至少

A. 2 周

B. 3 周

C. 4 周

D. 5 周

E. 6 周

正确答案：E,

第 114 题 (单项选择题)

知识点：心脏按压

胸外心脏按压正确的部位是

A. 心前区

B. 胸骨中下部

C. 胸骨中上 1/3 交界处

D. 胸骨中部

E. 胸骨角

正确答案：B,

第 115 题 (单项选择题)

知识点：结肠癌

右侧结肠癌最多见的大体形态是

- A.浸润型
- B.溃疡型
- C.肿块型
- D.浸润溃疡型
- E.弥漫型

正确答案：C,

第 116 题 (单项选择题)

知识点：溃疡

十二指肠球部后壁溃疡最常发生的并发症是

- A.穿孔
- B.幽门梗阻
- C.胆囊炎
- D.胰腺炎
- E.出血

正确答案：E,

第 117 题 (单项选择题)

知识点：疝

男性，50岁，腹股沟三角突出半球形包块，易还纳，未进入阴囊，不透光，主要考虑为

- A.鞘膜积液

B.隐睾

C.股疝

D.斜疝

E.直疝

正确答案：E,

第 118 题 (单项选择题)

知识点：医患关系

医患关系是一种

A.主从关系

B.商品关系

C.信托关系

D.单纯的技术关系

E.陌生人关系

正确答案：C,

第 119 题 (单项选择题)

知识点：心理评估

心理评估常用的方法不包括

A.会谈法

B.调查法

C.实验法

D.作品分析法

E.心理测验法

正确答案： C,

第 120 题 (单项选择题)

知识点： 疾病传播可引起疾病爆发的是

A.接触传播

B.诊疗技术传播

C.水和食物传播

D.各种制剂传播

E.虫媒传播

正确答案： C,

第 121 题 (单项选择题)

知识点： 抽样检查

从设计规定的研究对象中随机抽出一部分进行调查,称为

A.普查

B.队列研究

C.病历对照研究

D.抽样调查

E.理论流行病学研究

正确答案： D,

第 122 题 (单项选择题)

知识点： 先心

小儿先天性心脏病中属于青紫型的是

A.室间隔缺损

B.动脉导管未闭

C.肺动脉狭窄

D.法洛四联症

E.主动脉缩窄

正确答案： D,

第 123 题 (单项选择题)

知识点：咽峡炎

疱疹性咽峡炎的病原体为

A.流感病毒

B.副流感病毒

C.柯萨奇病毒

D.单纯疱疹病毒

E.腺病毒

正确答案： C,

第 124 题 (单项选择题)

知识点：肾病综合征

小儿肾病综合征最早出现的表现为

A.肉眼血尿

B.水肿

- C.少尿
- D.面色苍白
- E.精神萎靡

正确答案：B,

第 125 题 (单项选择题)

知识点：败血症

新生儿败血症的主要治疗是

- A.碳酸氢钠
- B.地塞米松
- C.苯巴比妥
- D.头孢他啶
- E.地高辛

正确答案：D,

第 126 题 (单项选择题)

知识点：滋养细胞肿瘤

滋养细胞肿瘤最常见的转移部位是

- A.肺
- B.阴道
- C.肾
- D.肝
- E.脑

正确答案：A,

第 127 题 (单项选择题)

知识点：闭经

最常见继发性闭经类型是

- A. 子宫性闭经
- B. 卵巢性闭经
- C. 垂体性闭经
- D. 下丘脑性闭经
- E. 原发性闭经

正确答案：D,

第 128 题 (单项选择题)

知识点：产后出血

引起产后出血最常见的原因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 软产道损伤
- C. 胎盘滞留
- D. 凝血功能障碍
- E. 急产

正确答案：A,

第 129 题 (单项选择题)

知识点：卵巢动脉

卵巢动脉来自

A.腹主动脉

B.髂总动脉

C.髂内动脉

D.髂外动脉

E.肾动脉

正确答案： A,

第 130 题 (单项选择题)

知识点：骨折

骨折病人发生休克的主要原因是

A.肿胀

B.出血

C.疼痛

D.惊吓

E.发热

正确答案： B,

第 131 题 (单项选择题)

知识点：腹膜炎

腹膜炎的主要标志是

A.明显的腹胀

B.腹部移动性浊音

C.肠鸣音消失或减弱

D.剧烈的腹绞痛

E.腹膜刺激症

正确答案：E,

第 132 题 (单项选择题)

知识点：痈

痈的急性化脓性感染分布在

A.单个毛囊及其所属皮脂腺

B.邻近多个毛囊及其附属皮脂腺

C.全身广泛的皮肤毛囊及其所属皮脂腺

D.皮肤网状淋巴管

E.肌间隙蜂窝组织

正确答案：B,

第 133 题 (单项选择题)

知识点：手术前准备

手术病人从术前 12 小时禁食,4 小时禁水是为了

A.减少术后感染

B.防止术后腹胀

C.防止吻合口瘘

D.防止术后伤口裂开

E.防止麻醉或术中呕吐

正确答案：E,

第 134 题 (单项选择题)

知识点：系统性红斑狼疮

使用环磷酰胺治疗系统性红斑狼疮的指标是

A. a 腔溃疡

B.关节炎

C.肾炎

D.浆膜炎

E.蝶形红斑

正确答案：C,

第 135 题 (单项选择题)

知识点：降糖药

易引起乳酸性酸中毒的口服降糖药是

A.磺脲类

B.苯甲酸衍生物

C. a 葡萄糖苷酶抑制剂

D.双胍类

E.格列尿类

正确答案：D,

第 136 题 (单项选择题)

知识点：糖尿病

糖尿病最常见的神经病变是

- A.周围神经炎
- B.动眼神经麻痹
- C.坐骨神经痛
- D.自主神经病变
- E.腕管综合症

正确答案：A,

第 137 题 (单项选择题)

知识点：白血病

下列临床表现中，最不常见于慢性粒细胞白血病的是

- A.乏力、发热
- B.体重减轻
- C.胸骨中下段压痛
- D.淋巴结肿大
- E.巨脾

正确答案：D,

第 138 题 (单项选择题)

知识点：肾衰竭

慢性肾衰竭进展过程中最早出现的临床表现常为

- A.消化道症状
- B.贫血

- C.出血
- D.反复感染
- E.骨痛

正确答案：A,

第 139 题 (单项选择题)

知识点：肝硬化

对肝硬化门脉高压诊断最有价值的是

- A.超声显示肝脏回声不均匀
- B.蜘蛛痣
- C.肝功能异常
- D.钡餐示食管下段有蚯蚓样充盈缺损
- E.脾大

正确答案：D,

第 140 题 (单项选择题)

知识点：溃疡

溃疡病致瘢痕性幽门梗阻最典型的临床表现是

- A.呕吐
- B.腹胀
- C.消瘦
- D.贫血
- E.脱水

正确答案：A,

第 141 题 (单项选择题)

知识点：感染性心内膜炎

确诊感染性心内膜炎最重要的辅助检查是

- A.血培养
- B.血白细胞计数
- C.血红细胞计数
- D.尿蛋白检测
- E.血沉检查

正确答案：A,

第 142 题 (单项选择题)

知识点：心包炎

缩窄性心包炎中最常见的病因是

- A.非特异性
- B.化脓性
- C.结核性
- D.真菌性
- E.肿瘤性

正确答案：C,

第 143 题 (单项选择题)

知识点：肺炎

休克型肺炎最常见的病原菌是

- A.军团菌
- B.肺炎球菌
- C.肺炎支原体
- D.格兰阴性杆菌
- E.金黄色葡萄球菌

正确答案：B,

第 144 题 (单项选择题)

知识点：支气管扩张

干性支气管扩张症的主要症状是

- A.反复咳嗽
- B.大量咳痰
- C.反复咯血
- D.营养不良
- E.肌肉酸痛

正确答案：C,

第 145 题 (单项选择题)

知识点：糖皮质激素

一般不宜应用糖皮质激素类药物的是

- A.败血症
- B.中毒性肺炎

C.重症肺炎

D.腮腺炎

E.中毒性菌痢

正确答案：D,

第 146 题 (单项选择题)

知识点：伤寒

伤寒小结的主要组成细胞是

A.类上皮细胞

B.巨噬细胞

C.多核巨细胞

D.浆细胞

E.淋巴细胞

正确答案：B,

第 147 题 (单项选择题)

知识点：法洛四联症

法洛四联症患者的青紫程度主要取决于

A.肺动脉狭窄的程度

B.室间隔缺损的大小

C.室间隔缺损的部位

D.主动脉骑跨的程度

E.右心室肥厚的程度

正确答案：A,

第 148 题 (单项选择题)

知识点：早孕检查

诊断宫内早孕的最可靠的辅助检查方法是

- A. 尿妊娠试验
- B. 基础体温测定
- C. B 超检查
- D. 阴道脱落细胞学检查
- E. 宫颈粘液涂片干燥后镜检

正确答案：C,

第 149 题 (单项选择题)

知识点：细菌性痢疾

细菌性痢疾的病理改变的主要部位是

- A. 盲肠
- B. 回肠末端
- C. 直肠和乙状结肠
- D. 升结肠
- E. 降结肠

正确答案：C,

第 150 题 (单项选择题)

知识点：肾结核

对诊断肾结核最有意义的是

A.尿路平片

B.肾图

C. B 超

D.静脉尿路造影

E.膀胱镜检

正确答案： D,