

1 女性生殖系统生理 2 学时

1. 29岁妇女，结婚3年不孕，基础体温曲线呈单相型，经前5天取宫颈粘液，其特征应是
A

- A. 量少粘稠
- B. 量少稀薄
- C. 量多粘稠
- D. 量多稀薄
- E. 量极少，不易取出

您所选的答案：

本题正确答案：D

2. 子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡，相当于月经周期的
A. 增生期早期 B. 分泌期早期 C. 增生期中期 D. 分泌期中期 E. 增生期晚期

本题正确答案：B

3. 卵子由卵巢排出后未受精，黄体开始萎缩是在排卵后的
A. 5~7天 B. 9~10天 C. 11~12天 D. 13~14天 E. 15~16天

本题正确答案： B

4、性激素的周期性变化中下述何项是正确的： B

- A 孕激素在排卵前有一低峰，排卵后才有高峰
- B 雌激素有两个峰值，排卵后的峰值较平坦
- C 雌、孕激素的峰值在排卵后第10天行成
- D 黄体分泌雌激素和孕激素，如不受精20天后退化
- E 在月经周期中均有较大量得雌孕激素

5、关于性轴的描述下列何项是错误的 D

- A FSH, LH在整个周期中都产生，但在排卵前1~2日有峰值，
- B FSH, LH在下丘脑产生的激素控制下分泌，
- C 卵巢周期性变化，直接受到下丘脑和垂体的控制，
- D 孕激素在月经周期中出现二个峰值，后面峰值较高，
- E 雌激素在月经周期中表现为排卵后的峰比前面平坦

6、关于卵巢的功能，下述何项是错误的 E

- A 卵巢分泌雌孕激素和雄激素
- B 新生儿的卵巢内有10万多个原始卵泡
- C 妇女一生中有400个左右卵泡发育成熟而排卵
- D 卵巢每月有数个卵泡发育，但只有一个卵泡发育成熟排卵

E 青春期有排卵并有月经来潮

7、32岁，妇女，14岁初潮，月经周期为34天，预测排卵期大约在月经周期的哪一天 D

- A 第14天
- B 第15天
- C 第16天
- D 第20天
- E 第24天

2 妊娠生理 4 学时

8、宫内妊娠时孕妇血清绒毛膜促性腺激素高峰出现在

- A. 5~7周
- B. 8~10周
- C. 11~13周
- D. 14~16周
- E. 17~19周

本题正确答案：B

9、妊娠早期羊水的主要来源是

- A. 母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
- B. 胎儿尿液
- C. 胎儿皮肤
- D. 胎儿肺
- E. 胎膜

本题正确答案：A

10、妊娠后半期羊水的重要来源是

- A 半膜的透析
- B 胎儿皮肤的透析
- C 胎儿呼吸道粘膜的透析
- D 胎儿尿液
- E 脐带表面的透析

本题正确答案：D

11、关于胎儿脐带血管氧含量，下列哪项是错误的

- A 脐带静脉含氧量较高
- B 胎儿下腔静脉血为混合血
- C 脐动脉含氧量最高
- D 胎儿主动脉氧含量较少
- E 胎儿肺静脉氧含量较少

本题正确答案：C

12、乳头乳晕着色，乳晕上皮脂腺肥大形成一个个小隆起

- A Hegar 征
- B 蜕膜斑
- C Montgomery 结节
- D Braxton Hicks 收缩

E 仰卧位低血压综合征

本题正确答案： C

13、关于妊娠期内分泌系统的变化，下列哪项是错误的

- A 脑垂体增加
- B 大量雌激素促使卵泡发育，但无成熟排卵
- C 垂体生乳素随妊娠进展而增加，到分娩前达到高峰
- D 胎盘分泌大量雌孕激素对丘脑下部及脑垂体产生负反馈作用，促性腺激素分泌减少
- E 由于胎盘的功能和胎儿肝脏以及肾上腺的作用，雌三醇大量合成

本题正确答案： B

14. 、一年轻妇女正常阴道分娩刚结束，检查胎盘和脐带时，应注意符合下列哪种情况才是正常的

- A 一条动脉，一条静脉
- B 一条动脉，二条静脉
- C 二条动脉，一条静脉
- D 二条动脉，二条静脉
- E 以上都不是。

本题正确答案： B

妊娠早期卵巢变化的特征是

- A 卵巢不断增大，黄体持续发育
- B 卵巢滤泡囊肿维持
- C 双侧卵巢黄体囊肿存在
- D 双侧卵巢妊娠黄体形成
- E 妊娠黄体功能在孕 10 周后由胎盘取代

本题正确答案： E

下述哪项产生绒毛膜促性腺激素

- A 蜕膜
- B 羊膜
- C 合体滋养细胞
- D 细胞滋养细胞
- E 以上均不是

本题正确答案： C

生殖内分泌疾病 1 学时

3 功能性子宫出血

36. 有排卵性功血的子宫内膜变化是

- A. 增生型子宫内膜
- B. 分泌型子宫内膜
- C. 萎缩型子宫内膜
- D. 子宫内膜腺囊型增生过长
- E. 子宫内膜腺瘤型增生过长

本题正确答案：B

1、引起功能失调性子宫出血的主要原因是：B

- A. 生殖系统有器质性改变
- B. 生殖系统出现内分泌失调
- C. 全身器质性改变
- D. 神经内分泌机理失调
- E. 神经系统调节功能障碍

功能失调性子宫出血是指

- A 生育年龄的子宫异常出血
- B 青春期子宫异常出血
- C 更年期子宫异常出血
- D 生殖器无器质性病变的出血
- E 伴有轻度子宫内膜非特异性炎症的子宫出血

本题正确答案：D

28、无排卵性出血的好发年龄应该是：

- A. 性成熟期妇女
- B. 青春期少女及绝经期妇女
- C. 绝经前期妇女
- D. 青春期少女及围绝经期妇女
- E. 绝经期前后的妇女

本题正确答案：D

无排卵型出血的临床最常见的症状是

- A 出血时伴有下腹疼痛
- B 不规则子宫出血
- C 月经周期缩短
- D 经期延长
- E 贫血及全身不适

本题正确答案：(B)

黄体萎缩不全所致的功血，哪项是错误的

- A 生育年龄妇女居多
- B 月经量少而持续点滴状出血
- C 基础体温呈单相
- D 内膜腺上皮高柱状，有核下空泡
- E 间质细胞肥大，呈多边形

本题正确答案： (C)

下列哪项应考虑为功血

- A 月经过多+进行性痛经
- B 月经周期紊乱+贫血
- C 月经过多+甲低
- D 月经过多+子宫增大不平
- E 月经不调+卵巢囊肿

本题正确答案 B

关于排卵型功血，下述哪项正确

- A 多见青春期、更年期
- B 基础体温呈单相
- C 周期短，规律，经量多少不定
- D 月经中期缺 LH 高峰
- E 月经前刮宫，内膜无分泌反应

本题正确答案 C

黄体功能不足患者，基础体温双相，周期缩短，应给下述何种治疗

- A 雌-孕激素序贯疗法
- B 排卵后肌注黄体酮 10mg/d，10-14 天
- C 低温相时给绒毛膜促性腺激素 (hCG)
- D 低温相时给雌激素
- E 低温相时给孕激素

本题正确答案 B

黄体功能不足

- A 经前诊刮子宫内膜分泌不足
- B 经期第 5 天子宫内膜为混合型
- C 经前诊刮子宫内膜呈增殖期
- D 经前诊刮子宫内膜为分泌期
- E 子宫内膜为蜕膜

本题正确答案 A

子宫肿瘤 2 学时

40、子宫肌瘤临床症状出现的迟早及严重程度主要取决于：B

- A、子宫肌瘤的数目 B、肌瘤的部位和大小 C、肌瘤是否有囊性变化
D、肌瘤是否有红色变性 E、肌瘤是否有玻璃样变性

子宫壁间肌瘤最主要的症状为

- A 月经不调
B 绝经后出血
C 月经过多
D 接触性出血
E 不规则阴道出血

本题正确答案：C

浆膜下子宫肌瘤最常见的症状是

- A 月经量过多
B 血性白带
C 痛经
D 继发性贫血
E 下腹部包块

本题正确答案：E

关于粘膜下肌瘤的临床表现下列哪项是错误的

- A 不规则阴道出血
B 发生症状较早较重
C 易发生蒂扭转
D 白带增多
E 子宫呈均匀增大

本题正确答案：C

关于子宫内膜癌下列哪项是错误的

- A 子宫内膜发生的癌，绝大多数为腺癌
B 为女性生殖道常见三大恶性肿瘤之一
C 多见于老年妇女
D 占女性生殖道恶性肿瘤的 20%-30%，
E 在我国其发生率也明显下降

本题正确答案：E

子宫内膜癌的癌前病变是

- A 萎缩型子宫内膜
B 增生期子宫内膜过长

- C 子宫内膜腺瘤型增生
- D 子宫内膜腺囊型增生
- E 子宫内膜分泌反应不良

本题正确答案：C

子宫内膜癌镜检分型

- A 腺癌
- B、腺棘皮癌
- C、鳞腺癌
- D 透明细胞癌
- E 以上都是

本题正确答案：E

早期确诊子宫内膜癌的主要方法是

- A 诊断性刮宫
- B 分段诊断性刮宫
- C 阴道脱落细胞检查
- D 宫腔冲洗细胞检查
- E 宫腔镜

本题正确答案：B

子宫内膜癌Ⅱ期的治疗原则是

- A 放疗
- B 化疗
- C 子宫根治术+盆腔淋巴结清扫术
- D 子宫全切除术+双侧附件切除术
- E 孕酮类治疗

本题正确答案：C

卵巢肿瘤 1 学时

59. 对放射治疗最敏感的卵巢恶性肿瘤是 2001

- A. 未成熟型畸胎瘤
- B. 浆液性囊腺癌
- C. 颗粒细胞瘤
- D. 无性细胞瘤
- E. 粘液性囊腺癌

您所选的答案：

本题正确答案：D

12、属于卵巢上皮性肿瘤的是：A

- A. 浆液性囊腺瘤 B. 无性细胞瘤 C. 内胚窦瘤
D. 颗粒细胞瘤 E. 畸胎瘤

61. 属于良性卵巢肿瘤的是 2001

- A. 内胚窦瘤
B. 库肯勃瘤
C. 颗粒细胞瘤
D. 无性细胞瘤
E. 卵泡膜细胞瘤

您所选的答案：

本题正确答案：E

34. 能引起子宫内膜增生过长的卵巢肿瘤是

- A. 成熟囊性畸胎瘤 B. 卵泡膜细胞瘤 C. 内膜样肿瘤 D. 内胚窦瘤 E. 浆液性囊腺瘤

本题正确答案：B

37. 52岁妇女，绝经6年，阴道淋漓流血10天。查右附件区扪及手拳大肿物，阴道脱落细胞提示雌激素高度影响。本例最可能的诊断应是右侧卵巢

- A. 纤维瘤 B. 浆液性囊腺瘤 C. 良性囊性畸胎瘤 D. 粘液性囊腺瘤 E. 卵泡膜细胞瘤

本题正确答案：E

13、下列那种肿瘤与梅格斯 (Meigs) 综合征有关：C

- A. 子宫肌瘤 B. 子宫体癌
C. 卵巢纤维瘤 D. 输卵管癌
E. 库肯勃瘤

最常用于诊断卵巢肿瘤的辅助手段为下列

- A CT 检查
B B型超声
C 腹部平片
D 腹腔镜检查
E 细胞学检查

本题正确答案：B

最常见的卵巢肿瘤是

- A 浆液性囊腺瘤
B 粘液性囊腺瘤
C 畸胎瘤
D 库肯勃瘤

E 颗粒细胞瘤

本题正确答案：A

卵巢良性肿瘤是

- A 无性细胞癌
- B 卵泡膜细胞癌
- C 颗粒细胞癌
- D 库肯勃瘤
- E 内胚窦瘤

本题正确答案：B

宫颈癌 2 学时

60. 宫颈癌的临床表现不包括

- A. 绝经后阴道出血
- B. 阴道排液
- C. 接触性阴道出血
- D. 不孕
- E. 血性白带

您所选的答案：

本题正确答案：D

9、早期宫颈癌的确诊方法是：B

- A、宫颈刮片细胞学检查
- B、宫颈及颈管的活体组织检查
- C、阴道镜检查
- D、碘试验
- E、分段诊刮术组织切片检查

子宫颈癌的临床分期是根据

- A 有无淋巴结转移
- B 手术后所见修订分期
- C 病理分级
- D 病灶侵犯范围

E 临床症状的严重程度

本题正确答案：D

早期发现宫颈癌的最佳方法是

- A 阴道镜检查
- B 碘试验
- C 宫颈刮片细胞学检查
- D 宫颈活体组织检查
- E 宫颈锥形切除

本题正确答案：C

37. 下述哪项是早期宫颈癌的症状： C

- A 阴道大量排液
- B 反复阴道出血
- C 接触性阴道出血
- D 大腿及腰骶部疼痛
- E 恶病质

38. 宫颈癌直接蔓延最常见的方式有 A

- A 向下至阴道粘膜
- B 向上至子宫内膜
- C 向前侵犯膀胱
- D 向后侵犯直肠
- E 向左右至主韧带

31. 子宫颈癌的好发部位是 D

- A 子宫颈管内
- B 宫颈阴道部
- C 子宫颈阴道上部
- D 鳞-柱上皮交界区
- E 柱状上皮处

41. 宫颈癌初程淋巴转移不包括 B

- A 宫颈旁淋巴
- B 膽前淋巴
- C 闭孔淋巴
- D 膜内淋巴
- E 膜外淋巴

1. 分娩时最主要的产力是

- A 子宫收缩力
- B 肛提肌收缩力
- C 腹肌收缩力
- D 膈肌收缩力
- E 腹压力

本题正确答案：A

21. 进入产程中的子宫收缩的特征，下列哪项是错误的

- A 是不自主的节律性收缩
- B 宫缩具有对称性
- C 宫缩的子宫底部为最强烈，子宫下段收缩最弱
- D 子宫肌纤维在宫缩时变短变宽，间歇时松也恢复如旧
- E 子宫收缩间隔越来越短，持续时间越来越长

本题正确答案：D

16. 初产妇第一产程活跃期延长是指活跃期超过

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时
- E. 12 小时

本题正确答案：C

24. 关于子宫下段，下列哪项是错误的

- A 系由子宫峡部形成，非孕时长约 1cm
- B 临产后子宫收缩极性的缘故，峡部被拉长形成子宫下段
- C 下段为被动扩张段，随产程进展而越来越长越薄
- D 子宫上下段肌壁厚薄不同，在产程中上、下段交界处在子宫内面形成一环状隆起，称生理性缩复环
- E 子宫下段常被产科医师选择为剖宫术子宫切开处

本题正确答案：B

17. 宫口开全后，开始保护会阴的时机应是

- A. 经阴道外口看到胎发时
- B. 胎头开始拨露时
- C. 胎头拨露 10 分钟时
- D. 胎头拨露阴唇后联合紧张时
- E. 胎头开始着冠时

您所选的答案：

本题正确答案：D

18. 分娩中协助胎先露在盆腔中内旋转的肌肉是

- A. 子宫平滑肌
- B. 会阴浅横肌
- C. 会阴深横肌
- D. 肛门括约肌
- E. 盆底肛提肌

您所选的答案：

本题正确答案：E

10. 临产的重要标志是

- A 见红，破膜，规律宫缩
- B 见红，规律宫缩，宫口扩张不明显
- C 见红，先露下降，伴有尿频
- D 规律宫缩，破膜，伴有见红，
- E 规律宫缩，逐渐增强，伴随进行性宫口扩张和先露下降

本题正确答案：E

11. 进入第二产程的标志是

- A 宫口开全
- B 胎头拨露
- C 产妇屏气，肛门放松
- D 宫缩时会阴膨出，肛门放松
- E 胎先露降至坐骨棘水平

本题正确答案：A

19. 新生儿娩出后首先应

- A. 断脐
- B. 擦洗新生儿面部
- C. 清理呼吸道
- D. 刺激新生儿足部
- E. 抓紧娩出胎盘及胎膜

本题正确答案：C

20 下列哪项不是胎盘剥离征象

- A 宫底升高且软
- B 子宫底升高且硬
- C 阴道少量出血
- D 外露脐带延长
- E 压耻骨联合上方，脐带不回缩

本题正确答案 A

21 一产妇临产 8 小时，肛查头先露，宫口已开全，先露+4，请问此时产力组成是下列哪种情况

- A 子宫收缩力
- B 子宫收缩力+腹肌收缩力
- C 子宫收缩力+膈肌收缩力
- D 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
- E 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力

本题正确答案 E

22、初产妇，孕 39 周，食欲正常，昨晚 8 时起有下腹部阵痛，一夜未睡，今晨就诊，精神疲乏，宫缩 10-20 秒，间隔 10-35 分钟，宫缩强度弱，肛查先露头，未入盆，宫口开 1 指尖，前羊膜囊不明显，骨盆测量无异常，最恰当的处理是

- A 肥皂水灌肠
- B 催产素，静脉滴注
- C 人工破膜
- D 哌替啶（杜冷丁）100mg 肌注
- E 补液支持疗法

本题正确答案 D

39. 孕 40 周临产，规则宫缩 12 小时，破膜 10 小时。肛查：宫口开大 5cm，先露+0.5，下列诊断哪项是正确的

- A 胎膜早破
- B 正常潜伏期
- C 正常活跃期
- D 潜伏期延长
- E 第一产程延长

本题正确答案 C

计划生育 2 学时

43. 新婚夫妇拟半年后再考虑妊娠来院咨询，最适宜的避孕方法应是

- A. 采用安全期避孕法
- B. 选择男用避孕套避孕
- C. 选择口服避孕药
- D. 放置宫内节育器
- E. 皮下埋置避孕药

本题正确答案：B

3. 妊娠 8 周时，终止妊娠最常采用的方法是

- A 钳刮术
- B 芫花宫腔内引产
- C 负压吸引术

- D 静脉滴注催产素
 - E 利凡诺尔羊膜腔内注射
- 本题正确答案：C

4. 关于人工流产下述哪项是错误的
- A 人工流产是指妊娠 10~21 周以内用人工方法中止妊娠
 - B 妊娠 10 周以内可用吸宫术
 - C 妊娠 10~14 周可用钳刮术
 - D 体温二次>37.5°C，为禁忌证
- 本题正确答案：A

11. 妊娠 16 周，需终止妊娠，最常用的方法是
- A 钳刮术
 - B 催产素静脉滴注
 - C 天花粉肌肉注射
 - D 负压吸引术
 - E 利凡诺尔羊膜腔内注射
- 本题正确答案：E

12. 妊娠 12 周，需终止妊娠，常用的终止妊娠方法
- A 钳刮术
 - B 催产素静脉滴注
 - C 天花粉肌肉注射
 - D 负压吸引术
 - E 利凡诺尔羊膜腔内注射
- 本题正确答案：A

29. 复方短效口服避孕药的副反应，正确的是
- A. 能引起经血量增多，不适用于经量偏多的妇女
 - B. 孕激素引起宫颈粘液量增多致白带增多
 - C. 体重减轻系因食欲不佳、进食少
 - D. 孕激素刺激胃粘膜致类早孕反应
 - E. 能使水钠潴留
- 本题正确答案：E

2. 宫内节育器避孕原理下列哪项是错误的：D
- A、通过异物的局部效应发挥作用
 - B、异物刺激子宫内膜产生非细菌性炎症反应
 - C、机械作用，阻止孕卵着床
 - D、通过抑制下丘脑—垂体—卵巢轴起作用
 - E、节育器刺激宫内膜产生前列腺素，影响孕卵着床
- 本题正确答案：D

17. 关于节育原理，下述哪项是错误的
- A 工具避孕—阻止精卵相遇

- B 宫内节育器—阻止受精卵着床
- C 口服避孕药—抑制排卵，改变宫颈粘液性状
- D 输卵管结扎—阻断精卵相遇
- E 探亲避孕药—防止受精

本题正确答案：E

33. 患者，27岁。早孕7周，行人工流产术中，患者突然恶心，出冷汗，查体：面色苍白，B P70/50mmHg，P60次/分。如何操作能减少上述情况的出现

- A 反复吸刮以防残留
- B 扩张宫颈要轻柔
- C 人流手术尽量在妊娠40天内进行
- D 人流手术时负压要大
- E 人流手术时要保证足够的手术时间

本题正确答案：B

盆腔炎性疾病 3 学时

24. 关于盆腔炎的传染途径，下列哪项是正确的

- A 产褥及流产后感染主要是血行性播散
- B 结核性盆腔炎主要是沿粘膜上行性感染
- C 沙眼衣原体是沿生殖器粘膜上行蔓延
- D 阑尾炎等消化道炎症可通过淋巴系统蔓延到内生殖器
- E 淋球菌是通过性接触后先入侵泌尿系统后再蔓延到生殖道

本题正确答案：C

27. 下列哪种情况不是急性生殖器炎症后病变

- A 输卵管积水
- B 输卵管卵巢囊肿
- C 卵巢巧克力囊肿
- D 慢性盆结缔组织炎
- E 慢性输卵管卵巢炎

本题正确答案：C

35. 女，35岁。腹痛，腹部肿块伴发热一周。不孕症十年（原发），查：T38.5°C，消瘦，心肺（-），下腹部可触及质韧肿块，压痛（+），活动欠佳。妇检：子宫正常，偏右，于子宫左侧及新生儿头大肿块，触痛（+）。曾用抗生素一周，体温及症状无缓解，如何处理：

- A 抗生素静脉、肌肉同时给药
- B 抗生素应用剖腹探查切除脓肿
- C 立即剖腹探查
- D 应用退热药（激素等）手术治疗

E 经阴道穿刺排脓

本题正确答案： B

36. 女，30岁。继发不孕5年，经后4天突起高热、寒战，下腹痛，右侧甚，血压110/80mmHg，脉搏120次/分，体温39°C，白细胞18×10⁹/L，中性80%，下腹轻压痛。妇查：宫颈稍大稍软，有压痛（+），双侧附件增厚，压痛，诊断为

- A 急性阑尾炎
- B 急性盆腔结缔组织炎
- C 急性盆腔腹膜炎
- D 急性子宫内膜炎
- E 以上均不是

本题正确答案： B

50. 高热、腹痛、触诊宫旁两侧片状增厚，诊为

- A 卵巢囊肿蒂扭转
- B 急性盆腔炎
- C 急性阑尾炎
- D 宫外孕
- E 卵巢巧克力囊肿

本题正确答案： B

51. 经期腹痛，子宫一侧或双侧可及肿物，活动受限，诊为

- A 卵巢囊肿蒂扭转
- B 急性盆腔炎
- C 急性阑尾炎
- D 宫外孕
- E 卵巢巧克力囊肿

本题正确答案： E

一妇女月经中期出现一侧下腹疼痛，查尿妊娠阴性，查B超提示腹腔内有大量积液，考虑下列哪种疾病

- A 卵巢黄体破裂
- B 急性盆腔炎
- C 急性阑尾炎
- D 宫外孕
- E 卵巢巧克力囊肿

本题正确答案： A

一妇女人流术后一周出现下腹疼痛，妇检子宫体压痛明显，双侧附件区未及异常包块，最考虑下列哪种疾病

- A 卵巢黄体破裂
- B 急性子宫内膜炎
- C 急性阑尾炎
- D 宫外孕
- E 卵巢巧克力囊肿

本题正确答案：B

关于女性生殖道的自然防御错误的是：

- A 阴道紧闭
- B 大阴唇闭合
- C 阴道有自洁功能
- D 阴道内无菌
- E 月经周期性来潮

本题正确答案：D

妊娠滋养细胞疾病 2 学时

2. 关于滋养细胞肿瘤下述哪项是正确的

- A 侵葡发生于流产、足月产后
- B 绒癌可发生于流产、足月产后
- C 异位妊娠后不可能发生滋养细胞肿瘤
- D 合体细胞性子宫内膜炎是恶性改变
- E 绒癌尿妊娠试验均 (+)

本题正确答案：B

26. 28岁经产妇，人工流产术后半年，术后断续阴道流血，量不多，术后一直避孕。尿妊娠试验阳性，查子宫超声卵大、软。胸片见两肺中下部有多处散在棉絮团影。本例最可能的疾病是

- A. 吸宫不全 B. 葡萄胎 C. 侵蚀性葡萄胎 D. 绒毛膜癌 E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

本题正确答案：D

8. 葡萄胎清宫术后3月，阴道不规则流血，子宫稍大，尿HCG(+)，胸片示双下肺有多处片状阴影。最可能的诊断是

- A. 葡萄胎残留 B. 先兆流产 C. 异位妊娠 D. 绒毛膜癌 E. 侵蚀性葡萄胎

本题正确答案：E

35. 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是

- A. 阴道流血时间长短 B. 距葡萄胎排空后时间长短 C. 尿中HCG值高低 D. 子宫大小程度不同 E. 活组织镜下见有无绒毛结构

本题正确答案：E

45. 诊断侵蚀性葡萄胎的可靠依据是

- A. 葡萄胎清宫后 6 周 HCG 仍阳性
- B. 葡萄胎清宫后 1 年出现阴道转移症状
- C. 葡萄胎清宫后 5 个月肺部出现转移灶
- D. 葡萄胎清宫后 6 月仍未出现典型双相体温
- E. 葡萄胎清宫后 1 年出现脑部转移症状

本题正确答案：C

48. 绒癌最常见的转移部位是

- A. 阴道
- B. 宫颈
- C. 肝脏
- D. 脑部
- E. 肺部

本题正确答案：E

44. 患者，25岁，女性，停经3个月，阴道淋漓流血2个月，阴道前壁有胡桃大紫蓝色结节，子宫软，如孕4个半月大小，尿妊娠试验(+)，应考虑为

- A. 葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 双胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 先兆流产

本题正确答案：B

13. 关于葡萄胎随访，下述哪项不需要

- A. 定期做阴道细胞学涂片检查
- B. 避孕措施不可采取上环
- C. 相当时期内指导避孕
- D. 定期作 hCG 定量检查
- E. 必要时作胸部 X 线检查

本题正确答案：A

23. 患者，38岁。10年前曾患葡萄胎，无诱因开始阴道流血，持续2个月，量时多时少，诊刮病理报告结果为：见滋养细胞增生活跃，未见绒毛结构，最可能诊断

- A. 绒癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 侵葡
- D. 功血
- E. 子宫肌瘤

本题正确答案：A

妊娠时限异常

1. 关于流产的定义，下列哪项是正确的

- A. 妊娠<28周，胎儿体重<1000g
- B. 妊娠<20周，胎儿体重<500g
- C. 妊娠 20~27 周，胎儿体重<500g
- D. 妊娠 20~27 周，胎儿体重<1000g
- E. 妊娠 12~20 周，胎儿体重<500g

本题正确答案：A

2. 关于流产，下列哪项是正确的
- A 完全流产，有腹痛，宫口松
 - B 先兆流产，出血量少，宫口闭
 - C 不全流产，宫口闭，出血少
 - D 难免流产，宫口闭，出血少
 - E 留滞流产，胚胎死亡达4周以上未自然排出

本题正确答案：B

3. 先兆流产与难免流产的主要鉴别要点是
- A 出血时间长短
 - B 下腹痛的程度
 - C 早孕反应是否存在
 - D 宫口开大与否
 - E 妊娠试验阳性

本题正确答案：D

4. 关于自然流产的症状，下列哪项是错误的
- A 妊娠12周后，先阴道流血后腹痛
 - B 晚期流产一般出血不多
 - C 妊娠8~12周阴道流血较多
 - D 妊娠8周前出血不多
 - E 妊娠8周后不完全流产较多

本题正确答案：A

7. 关于流产的治疗原则，下列哪项是错误的
- A 难免流产应行刮宫术
 - B 不全流产应行刮宫术
 - C 患者自述阴道有组织物从阴道内排出，但阴道流血未见减少，应行刮宫术
 - D 感染性流产出血不多，应抗感染及刮宫同时进行
 - E 子宫内口松弛者，应在妊娠16~22周时行子宫颈内口缝扎术

本题正确答案：B

8. 妊娠12周，阴道流血7天，体温38°C，白细胞 $12\times 10^9/L$ ，首先处理方法是
- A 立即刮宫后再给抗生素
 - B 立即给抗生素后再刮宫
 - C 观察阴道出血时再刮宫
 - D 立即给麦角注射
 - E 保胎治疗

本题正确答案：D

10. 子宫小于孕3个月的稽留流产，其处理原则应是
- A 先给予抗生素行钳手术
 - B 立即行宫颈扩张及钳刮术
 - C 先给予催产素，后行钳刮术
 - D 先给予雌激素，后行钳刮术

E 药物引产

本题正确答案：B

11. 关于难免流产哪项是错误的

- A 阴道流血增加
- B 下腹痛加剧
- C 有部分胎盘嵌顿于宫颈口，部分胎盘排出
- D 宫口开
- E 子宫体与孕周相符或略小于孕周

本题正确答案：C

120. 停经 11 周，阴道少量流血 10 天，三天前阴道流血增多，下腹阵痛，伴有胎盘组织排出，昨起发热，今体温 38.5°C ，血压 $10/8\text{kPa}$ ，心率 122 次/分，神萎。阴道检查；外阴有多量流血，宫口开，容一指，子宫口处可触及胎盘组织，子宫 6+ 周大小，有压痛 (++)，附件稍增厚，压痛 (+)，腹软，无肌紧张及反跳痛，血红蛋白 70g/L ，白细胞 $16 \times 10^9 /L$ ，中性 0.90。临床诊断是

- A 难免流产
- B 不完全流产
- C 完全性流产
- D 不完全性流产伴感染
- E 完全性流产伴感染

本题正确答案：D

妊娠特有疾病

妊娠高血压疾病

26. 妊娠高血压综合征的基本病变为

- A 肾素-血管紧张素-前列腺素系统平衡失调
- B 慢性弥散性血管内凝血
- C 血液高度浓缩
- D 水钠严重潴留
- E 全身小动脉痉挛

本题正确答案：E

27、妊高征的治疗原则是：E

- A 利尿
- B 降压
- C 剖宫产
- D 扩容
- E 解痉降压、镇静治疗、适时终止妊娠

28. 大剂量硫酸镁治疗妊娠高血压综合征最早出现的中毒反应是 2002

- A 心率明显减慢
- B 呼吸次数明显减少
- C 血压大幅度降低
- D 尿量明显减少
- E 膝反射消失

您所选的答案：

本题正确答案：E

29. 初孕妇，26岁。于妊娠34周出现头痛、眼花。血压180 / 100mmHg，尿蛋白(++)，眼底动静脉比为1:2，视网膜水肿。诊断应是

- A. 中度妊高征 B. 先兆子痫 C. 子痫 D. 妊娠合并原发性高血压 E. 妊娠合并肾性高血压

本题正确答案：B

30. 妊高征时24小时尿蛋白定量达到或超过，下述何项列为重度妊高征

- A $\geq 1\text{g}$
B $\geq 3\text{g}$
C $\geq 5\text{g}$
D $\geq 10\text{g}$
E $\geq 15\text{g}$

本题正确答案：C

34. 下列何项不是重度妊高征的标志

- A 血压 $>21.3 / 14.7 \text{kPa}$ (160/110 mmHg)
B 24小时尿蛋白定量 $>5\text{g}$
C 头痛，视力障碍
D 下肢水肿(++)
E 眼底动脉痉挛伴视网膜水肿

本题正确答案：D

36. 硫酸镁用以治疗妊高征时，下述哪项不对

- A 最主要用以解痉和降低神经兴奋性，以预防和控制抽搐
B 24小时硫酸镁总量不得超过10g
C 尿量少于 25ml/h 或呼吸 <16 次/分时停用
D 膝反射消失者禁用
E 硫酸镁中毒时，用葡萄糖酸钙缓慢推注治疗之

本题正确答案：B

37. 关于重度妊高征的治疗，下列哪项不适宜

- A 解痉，镇静，防止抽搐
B 在解痉的基础上，扩容利尿
C 适时终止妊娠
D 严格控制钠盐摄入量，防止水肿加重
E 扩容剂的选择，胶体溶液优于晶体溶液

本题正确答案：D

38. 妊娠近足月患先兆子痫的孕妇，恰当的处理应是

- A 积极治疗，等待产程发动
B 积极治疗24~48小时，症状无明显改善时应终止妊娠
C 积极治疗一周后，予以引产
D 立即引产
E 立即行剖宫术

本题正确答案：B

102. 初孕妇，妊娠38周，妊高征头痛眼花一周，尿蛋白（+++），尿雌三醇5.9mg/24h，监护结果：胎心晚期减速，此时恰当处理是

- A 改善胎盘功能，维持妊娠
- B 治疗妊高症待症状好转后剖腹产
- C 治疗妊高征的同时立即剖腹产
- D 催产素引产
- E 治疗妊高征待病情好转后引产

本题正确答案：C

异常分娩 2 学时

1. 关于协调性宫缩乏力正确的是

- A 宫缩极性，对称性正常，仅收缩力弱
- B 多数产妇觉持续腹痛，且产程延长
- C 容易发生胎儿窘迫
- D 不易静脉滴注催产素
- E 不易发生胎盘残留

本题正确答案 A

7. 关于臀位，下述哪项是正确的

- A 脐右前位时，胎臀的粗隆间经衔接于骨盆入口左斜径上
- B 子宫收缩乏力的发生率并不增多
- C 胎臀已进入盆腔，排出胎便是胎儿窘迫的征象
- D 产妇于第一产程期间不宜灌肠
- E 以上都不对

本题正确答案 D

9. 子宫病理收缩环是指

- A 子宫上下段之间形成缩窄环并随宫缩渐次上升
- B 子宫某部肌肉呈不协调收缩形成环状狭窄
- C 子宫上下段之间形成环，但不随宫缩而上升
- D 宫缩时硬，子宫松弛时为软
- E 常发生于孕期

本题正确答案 A

28. 初孕妇，26岁。孕1产0，孕40周，阵发性腹痛6小时入院。骶耻外径18cm，坐骨结节间径8cm，查宫高38cm，腹围98cm。骶左前，胎心140次/分，肛查，宫口开3cm，未破膜，足先露，入院后5小时宫缩30秒，6~7分，产程无进展，其处理哪项最恰当

- A 静滴催产素
- B 温胎皂水灌肠
- C 人工破膜
- D 不需处理，继续观察
- E 剖宫产

本题正确答案 E

32. 某产妇宫口已开全2小时，阴道检查胎头矢状缝与中骨盆横径一致，小囟门在3点，大囟门在9点。是下列何种方位

- A LOT
- B ROT
- C LOA
- D ROA
- E LOP

本题正确答案 A

41. 临产后宫缩一直短而弱，间歇长，产程进展慢

- A 低张性宫缩乏力
- B 高张性宫缩乏力
- C 原发性宫缩乏力
- D 继发性宫缩乏力
- E 正常子宫收缩乏力

本题正确答案 C

42. 产程进展到一定阶段后，宫缩减弱，出现宫缩乏力

- A 低张性宫缩乏力
- B 高张性宫缩乏力
- C 原发性宫缩乏力
- D 继发性宫缩乏力
- E 正常子宫收缩乏力

本题正确答案 D

38. 活跃期停滞

- A 从规律宫缩开始，经 16 小时宫口扩张至 2cm
- B 初产妇宫口开全 2 小时尚未分娩
- C 宫口在开至 5cm 后，2 小时仍 5cm
- D 8 小时前宫口扩张 3cm，现宫口尚未开全
- E 宫口开全已 1 小时，胎头下降无进展

本题正确答案 C

29. 初孕妇，26岁。妊娠38周，规律宫缩8小时，宫口开大6cm，S+1，胎膜已破，胎儿体重估计3000g，血压130 / 80mmHg，胎心144次/分。2小时后肛查：宫口仍6cm，边薄，先露S+1，宫缩力弱，20秒/5~6分，胎心好。应诊断为

- A. 潜伏期延长 B. 活跃期延长 C. 活跃期停滞 D. 第二产程延长 E. 滞产

本题正确答案：C

21. 女，28岁。孕38+周，上午9时有规律宫缩而入院。宫缩中下，35秒，间隔3~4分钟，于19时宫口开一指，先露S-1.5，给予催产素2.5单位加强宫缩使转为中等强度，40秒，间隔2~3分钟，产妇一般情况好，3小时后宫口开4cm，先露为S-1，此时应如何处理

- A 哌替啶（杜冷丁）100mg 肌注使休息
- B 阴道检查排除骨产道异常后作人工破膜
- C 剖宫产
- D 宫颈注射阿托品
- E 加大催产素滴注量

本题正确答案 B

- 24、滞产是指总产程超过： C
A、20h B、22h C、24h D、48h E、16h

- 关于臀位，下述哪项是正确的
A 脐右前位时，胎臀的粗隆间经衔接骨盆入口左斜径上
B 子宫收缩乏力的发生率并不增多
C 胎臀已进入盆腔，排出胎便是胎儿窘迫的征象
D 产妇于第一产程期间不宜灌肠
E 以上都不对
本题正确答案 D

4. 第一产程活跃期停滞是指宫口不再扩张达
A 0.5 小时以上
B 1 小时以上
C 1.5 小时以上
D 2 小时以上
E 2.5 小时以上
本题正确答案 D

妊娠晚期出血 1.5 学时
前置胎盘、胎盘早剥

44. 前置胎盘病例，仅适用于阴道分娩的是
A 部分性前置胎盘而胎儿为头位
B 低置胎盘而胎儿为头位
C 部分性前置胎盘而胎儿为臀位
D 低置胎盘而胎儿为臀位
E 以上都不是
本题正确答案 B

45. 前置胎盘的正确处理是
A 有阴道出血，即终止妊娠
B 分娩方式，宫口开，剖腹产
C 胎儿死亡，均以阴道分娩
D 疑有前置胎盘，肛诊时宜轻柔
E 大出血时，可不经阴道检查，作剖腹产
本题正确答案 E

46. 完全性前置胎盘不可能发生在下述何种情况
A 胎位 LST，单臀，先露未入盆
B 胎位 RSCP
C 胎位 LOP，胎头未入盆

D 胎位 ROA , 先露已衔接

E 胎位 LOT , 先露高浮

本题正确答案 D

47. 妊娠晚期出血的处理哪项不对

A 在排除前置胎盘之前应禁止肛指检查

B 有必要用阴道拉钩或窥阴器协助下 窥视宫颈有无息肉或糜烂出血

C 可以作阴道穹隆扪诊以查觉有否前置胎盘

D 应常规作 B 超检查

E 如胎儿已死, 原则上尽量阴道分娩

本题正确答案 E

48. 下列哪项不符合中央性(完全性)前置胎盘的常见临床表现

A 胎位不正的发生率高

B 先露高浮

C 第一次出血多在孕 36 周以后

D 易发生出血性休克

E 较其他类型前置胎盘易发生胎儿宫内窘迫

本题正确答案 C

49. 下列哪项不符合前置胎盘的表现

A 先露下降受阻

B 无痛性阴道流血

C 子宫下段闻及胎盘血流音

D 子宫张力较高, 胎心音不易闻及

E 宫底高度与孕周相符

本题正确答案 D

50. 关于胎盘早剥时的处理, 正确的是

A 纠正休克, 大量补液

B 确诊为轻型者, 可行期待疗法

C 经阴道分娩者不宜破膜

D 产妇情况恶化, 不论胎儿是否存活, 均应及时行剖宫产术

E 应用肝素治疗凝血功能障碍

本题正确答案 D

51. 胎盘早期剥离的严重并发症

A 失血性休克

B 产后出血

C 产后感染

D 凝血功能障碍

E 子宫卒中

本题正确答案 D

52. 胎盘早剥的正确处理是

- A 一旦确诊后应立即终止妊娠
- B 出血不多可作期待疗法
- C 胎儿死亡均取阴道分娩
- D 破膜后可以头皮钳牵引胎头止血
- E 子宫有胎盘卒中可用按摩法促使子宫收缩

本题正确答案 A

53. 胎盘早剥哪项是正确的

- A 先期待疗法后考虑终止妊娠
- B 多无诱因，往往在半夜阴道出血
- C 易发生产后出血，为软产道损伤所致
- D 贫血程度与阴道出血量成正比
- E 子宫坚硬压痛，宫底逐渐升高胎心不清

本题正确答案 E

54. 最易发生 DIC 的疾病是

- A 妊高征
- B 前置胎盘
- C 胎盘早期剥离
- D 死胎
- E 羊水过多症

本题正确答案 C

55. 初产妇重症胎盘早剥，宫口开大 4cm，最佳的处理方法是

- A 人工破膜加静滴催产素
- B 剖腹产
- C 人工破膜加头皮钳牵引
- D 静滴催产素
- E 抗休克同时给予抗凝药

本题正确答案 B

56. 正常位置胎盘早剥，哪一项是错误的

- A 附着在子宫下段，胎盘发生剥离
- B 妊娠晚期腹痛性阴道流血，首先考虑胎盘早剥
- C 胎盘早剥一旦确诊，应尽快终止妊娠
- D 症状出现争取 6 小时内结束分娩
- E 重症胎盘早剥可诱发 DIC

本题正确答案 A

57. 诊断重型胎盘早期剥离的依据，下列哪项是错误的

- A 胎盘异常
- B 胎心听不到
- C 子宫底不断升高

D 少量阴道出血

E 凝血功能障碍

本题正确答案 A

58. 下列哪种情况不是重度胎盘早剥的临床表现

A 剧烈腹痛后阴道流血

B 阴道出血量与全身症状不成正比

C 子宫底升高

D 子宫板状

E 胎位，胎心清晰

本题正确答案 E

59. 下列哪项处理胎盘早剥是错误的

A 重度胎盘早剥，不能在短时间内结束分娩者剖宫产

B 发现子宫胎盘卒中，立即行子宫切除术

C 轻度胎盘早剥，胎儿存活，胎儿宫内窘迫者剖宫产

D 破膜后产程无进展，产妇情况恶化，胎儿死亡，亦要行剖宫产

E 初产妇轻度胎盘早剥，估计短时间内能结束分娩者可阴道分娩

本题正确答案 B

60. 关于胎盘早剥的描述，哪项不准确

A 常发生于妊高征患者

B 附着在子宫下段的胎盘发生剥离而引起临床症状

C 重型胎盘早剥提示胎盘剥离面超过 1.3

D 重型隐性胎盘早剥易诱发 DIC

E 胎盘早剥一经确诊应迅速结束分娩

本题正确答案 B

妊娠晚期并发症 1.5 学时

产后出血

2. 关于产后出血的定义下述哪项是正确的

C

A 分娩过程中出现血量>500ml

B 胎盘娩出后 24 小时内阴道流血量超过 500ml

C 胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量超过 500ml

D 产后 24 小时到产后 10 天阴道出血>500ml

E 胎儿娩出后，阴道流血>500ml

5. 关于产后出血的预防，下列哪项是错误的 D
- A 对具有较高产后出血危险的产妇做好及早处理的准备工作如配血
 - B 第一产程要避免产妇过度疲劳
 - C 第二产程时要指导产妇适时及正确使用腹压
 - D 双胎妊娠，在第一胎肩部娩出后应肌注麦角新碱 0.2mg
 - E 产后 2 小时内在产房内观察宫缩及阴道流血情况
12. 女，25岁。孕40周，初孕，规律宫缩2小时来院，当时宫口扩张4cm，因宫缩强，半小时后宫口开全，第二产程仅15分钟即顺利娩出一男婴，胎儿娩出后即有鲜红血流出，5分钟后胎盘自然娩出。此后出血量仍较多，有血块。此时分析其出血原因最可能为 D
- A 子宫收缩乏力
 - B 胎膜残留
 - C 胎盘残留
 - D 宫颈裂伤
 - E 凝血功能障碍
13. 初产妇，急产娩一男婴，体重3900g，胎盘娩出后半小时内有较多量间歇性阴道出血，色红，宫底，宫颈及肌肉已注催产素10单位，再次查看胎盘完整，胎膜有一处见血管中断于胎膜边缘，究竟其出血原因最可能是 C
- A 胎盘剥离不全
 - B 软产道损伤
 - C 胎盘残留
 - D 产后宫缩乏力
 - E 凝血功能障碍
15. 初孕妇，25岁，低位产钳分娩，胎儿娩出后即出现阴道持续流血400ml，色鲜红，血压14.7/9.33kPa，子宫硬，最适宜的处理是 D
- A 注射催产素
 - B 注射麦角新碱
 - C 输液，配血
 - D 开放静脉输液，手取胎盘，检查阴道及宫颈，如有裂伤则缝合
 - E 仔细检查阴道及宫颈，有裂伤即缝合
20. 女，32岁。孕40周，妊娠合并子宫肌瘤，阴道分娩胎盘娩出后阴道出血量多，暗红色
检查：宫底高，子宫软，产道无裂伤，血自宫腔流出，有血块，检查胎盘完整，血压14.6/12kPa
(110/90mmHg)。除给宫缩剂外首先处理的是 C
- A 止血剂
 - B 抗炎
 - C 迅速按摩子宫止血
 - D 子宫腔内纱布填塞
 - E 膜内动脉结扎
21. 经产妇36岁，孕40周，晨3时突然大量阴道出血，急诊来院，体检：血压16/10kPa
(120/75mmHg)，尿蛋白(-)，腹部检查：子宫高35cm，胎头高浮，子宫前壁无压痛。阴道
检查：阴道内有手拳大的凝血块，宫颈软，宫口开大一指，先露部未及胎盘组织。请考虑哪
项出血原因 D
- A 子宫破裂

- B 宫颈裂伤
- C 胎盘早剥
- D 前置胎盘（边缘性）
- E 正常临产见红

26. 第三产程中，子宫不协调性收缩可造成 D

- A 胎盘残留
- B 胎盘粘连
- C 胎盘剥离不全
- D 胎盘嵌顿
- E 胎盘植入

异位妊娠 1 学时

23、30岁已婚妇女，停经48天，剧烈腹痛2天，阴道不规则流血1天，今晨从阴道排出三角形膜样组织，检查贫血外貌，下腹部压痛、反跳痛明显。正确治疗措施应选择

- A. 立即行刮宫术
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌注麦角新碱
- D. 行剖腹探查术
- E. 应用止血药

本题正确答案：A

24、提示与习惯性流产有相关性的检查是

- A. 抗着丝点抗体
- B. 抗磷脂抗体
- C. 抗 RNP 抗体
- D. 抗组蛋白抗体
- E. 抗中性粒细胞胞浆抗体

本题正确答案：B

25. 输卵管妊娠最常发生于

- A. 输卵管伞部
- B. 输卵管峡部
- C. 输卵管峡部与壶腹部之间
- D. 输卵管堂腹部
- E. 输卵管间质部

本题正确答案：C

136. 女，32岁，停经56天，3天前开始有少量断续阴道出血，昨日始右下腹轻痛，今晨加强，呕吐二次。妇检：子宫口闭，宫颈举痛（+），子宫前倾前屈，较正常稍大，软，子宫右侧可触及拇指大小较软之块物，尿 hCG（±），后穹隆穿刺吸出10ml 不凝血液。血象：白细胞 10×10^9 /L，中性0.8，血红蛋白75g/L，体温37.5°C，血压10/6kPa(75/45mmHg)。最可能的诊断是

- A 不完全流产
- B 右卵巢黄体破裂
- C 右输卵管妊娠

D 急性附件炎

E 卵巢囊肿蒂扭转

本题正确答案：C

17. 有关宫外孕，下述哪项是正确的

A 以间质部分妊娠最常见

B 一般子宫增大情况与停经天数相符

C 子宫内膜也发生蜕膜变化

D 阴道流血多，易致失血性休克

E 后穹隆穿刺阴性可否定子宫外孕

本题正确答案：C

18. 关于异位妊娠的诊断下述哪项最重要

A 病史

B 腹部检查及阴道检查

C 后穹隆穿刺

D hCG 测定

E 诊刮

本题正确答案：C

21. 异位妊娠是指

A 受精卵着床于子宫以外

B 受精卵着床于子宫+附件以外

C 受精卵着床于子宫体腔以外

D 受精卵着床于腹腔以外

E 受精卵着床于宫颈管以外

本题正确答案：C

25. 急性输卵管妊娠破裂或流产手术应遵循哪项原则

A 尽快钳夹出血处，切除或保留患侧输卵管

B 切除子宫

C 进行对侧输卵管整形术

D 切除患侧附件

E 尽量吸出腹腔血液作自家输血

本题正确答案：A

3 多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症 2 学时

47. 子宫内膜异位症病灶最多见的部位是

A. 卵巢 B. 输卵管 C. 子宫后壁下段 D. 直肠子宫陷窝 E. 宫骶韧带

本题正确答案：A

17、子宫内膜异位症的主要临床表现是：C

- A、下腹部持续隐痛
- B、子宫明显增大
- C、继发性和渐进性痛经
- D、后穹隆触痛宫颈举痛
- E、低热、消瘦

关于子宫内膜异位症下述哪项是错误的

- A 多见于生育年龄妇女，以 30 岁-40 岁居多
- B 发病与卵巢的周期性变化有关
- C 子宫内膜出现和生长在子宫肌层
- D 具有类似恶性肿瘤的远处转移和种植能力
- E 一般极少发生恶变

本题正确答案 C

子宫内膜异位症痛经的特点是 B

- A 痛经发生于月经前期
- B 痛经发生于月经前，经期加重，经后缓解
- C 痛经与月经周期无关
- D 痛经经期较微，经后加重
- E 痛经多为原发性痛经

本题正确答案 B

5. 子宫内膜异位症最主要的临床特点是 C

- A 月经失调
- B 不孕症发生率高达 40%
- C 痛经和持续性下腹痛
- D 咳血
- E 腹痛，腹泻或便秘

12. 28 岁妇女，原发不孕进行性痛经 5 年，妇查：子宫大小正常，后倾，欠活动，后壁有 2 个黄豆大小痛性结节，左侧附件可扪及直径约 3cm 大小的囊性包块，不活动，右侧附件增厚。

其诊断考虑为 C

- A 慢性盆腔炎
- B 结核性盆腔炎
- C 子宫内膜异位症
- D 双侧附件炎性包块
- E 卵巢恶性肿瘤

11. 40 岁妇女，人工流产术后 10 年未孕，近 3 年来，月经量多，经期腰腹坠痛加重，妇查：

子宫鹅卵大，球形，硬，附件正常，首选诊断是 B

- A 子宫肌瘤
- B 子宫腺肌病
- C 盆腔炎性肿物与子宫粘连
- D A sherman 综合征
- E 子宫内膜癌

关于子宫腺肌病，下述表达正确的是

- A 多数合并外在性子宫内膜异位症
- B 多发生在初产妇
- C 病灶中子宫内膜对卵巢激素敏感
- D 假孕疗法有效
- E 月经量增多，经期延长，继发痛经，子宫均增大和质较硬

本题正确答案 E

胎儿宫内窘迫

4. 关于胎儿电子监测，提示胎儿缺氧的是

- A 加速
- B 早期减速
- C 变异减速
- D 晚期减速
- E 以上都不是

9. 初孕妇，月经周期正常，停经 43 周，无其他并发症，NST 两次无反应，OC T10 分钟内 3 次宫缩每次持续 40~50 秒，均出现晚期减速，1 周前 24 小时，尿 E 3 :15mg，现仅 8mg。应如何处理

- A 立即人工破膜引产
- B 口服雌激素 3 天
- C 催产素引产
- D 立即剖宫产
- E 1 周后复查

12. 足月临产，胎膜破裂流出棕黄色羊水，胎儿监护时可能出现

- A 迟发性胎心减速
- B 晚期减速
- C 变异减速
- D 散发的，短暂的胎心率加速
- E 胎心基线率有变异

13. 临产后，由于子宫收缩时脐带受压，兴奋迷走神经，胎儿监护时可能出现

- A 迟发性胎心减速
- B 晚期减速
- C 变异减速
- D 散发的，短暂的胎心率加速
- E 胎心基线率有变异

14. 胎心减慢开始于宫缩高峰后，下降缓慢，持续时间长，恢复亦缓慢

- A 胎儿情况良好
- B 缺氧，酸中毒
- C 胎头受压
- D 脐带受压
- E 镇静药物影

15. 胎心减速与宫缩关系不恒定，出现时下降迅速，幅度大，恢复也迅速

- A 胎儿情况良好
- B 缺氧，酸中毒
- C 胎头受压
- D 脐带受压
- E 镇静药物影响

18. 判断胎儿储备功能

- A L/S 比值
- B NST
- C 羊水穿刺
- D 阴道涂片细胞学检查
- E OCT

22. 提示胎儿储备功能丧失

- A 胎儿心率每分钟持续在 150 次以上
- B 胎儿心率每分钟持续在 120 次，历时 10 分钟
- C 胎儿心率有基线摆动
- D 胎儿心率静止型
- E 胎儿心率有变异

7. 下列何种现象不能提示胎儿窘迫 E

- A 胎心率>160 次/分
- B 胎心率<120 次/分
- C 头皮血液 pH 值<7. 2
- D 头位时羊水含胎粪
- E 宫缩时出现早期减速

8. 下述何项不是胎儿缺氧的表现 E

- A 晚期减速
- B 胎动记数<10 次/12 小时
- C 羊水黄绿色
- D 胎儿头皮血 pH 值 7. 28
- E CST 示早期减速

第一单元 女性生殖系统解剖

1. 关于女性内生殖器的血管，下列哪项不正确

- A 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
- B 右卵巢动脉可来自右肾动脉
- C 左卵巢动脉可来自左肾动脉
- D 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支
- E 会阴动脉为阴部内动脉的分支

参考答案：B

2. 关于女性生殖器解剖，不正确的是

- A 子宫颈管上皮为高柱状
- B 阴道上皮为复层鳞状上皮
- C 输卵管上皮细胞均为带纤毛的细胞
- D 卵巢的表面由单层立方上皮覆盖称为生发上皮
- E 宫颈管外口复层鳞状细胞和柱状细胞交界处是宫颈癌好发的部位

参考答案：C

3. 有关女性生殖器淋巴的引流，下述哪项是错误的

- A 外阴淋巴大部分汇入腹股沟浅淋巴结
- B 阴道下段淋巴汇入腹股沟浅淋巴结

- C. 腹股沟浅淋巴结汇入髂淋巴结组
- D. 宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴
- E. 子宫体淋巴汇入腰淋巴及腹股沟浅淋巴结

参考答案: D

- 4. 右侧卵巢静脉汇入:

- A 下腔静脉
- B 右肾静脉
- C 右髂内静脉
- D 右髂总静脉
- E 右髂外静脉

参考答案: A

- 5. 维持子宫前倾的韧带是

- A 圆韧带
- B 阔韧带
- C 主韧带
- D 骶骨韧带
- E 圆韧带+骶骨韧带

参考答案: E

- 6. 关于子宫的解剖不正确的是

- A 大小为 $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$
- B 容积为 5ml
- C 重量约 50g
- D 成年女性的宫颈和宫体之比为 $1:2$
- E 子宫峡部在非孕状态约为 $2\sim 3\text{cm}$

7. 关于正常骨产道, 下述哪项是正确的

- A. 骨盆入口前后径比横径大
- B. 中骨盆平面横径比前后径大
- C. 骨盆入口平面是骨盆的最宽平面
- D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面
- E. 站立时骨盆入口平面与地平面平行

参考答案: D

- 8. 关于子宫峡部正确的是

- A. 指子宫体与子宫颈之间最狭窄的部分
- B. 峡部下端为解剖学内口
- C. 峡部粘膜为高柱状上皮
- D. 非孕妇女长约 3cm
- E. 妊娠末期形成子宫下段临产后可达脐上一横指

参考答案: A

- 9. 妇科手术在处理下列组织时最易损伤输尿管的部位, 正确的是

- A. 骨盆漏斗韧带、主韧带、圆韧带
- B. 主韧带、骨盆漏斗韧带、子宫动脉
- C. 子宫动脉、宫骶韧带、卵巢固有韧带
- D. 输卵管系膜、卵巢固有韧带、子宫动脉
- E. 圆韧带、宫骶韧带、子宫动脉

参考答案: B

- 10. 会阴侧切时会切到哪些盆底肌肉

- A. 会阴深横肌, 球海绵体肌, 耻骨尾骨肌
- B. 会阴深横肌, 坐骨海绵体肌, 耻骨尾骨肌
- C. 尿生殖膈下筋膜, 会阴深横肌, 骶骨尾骨肌
- D. 会阴浅横肌, 会阴深横肌, 坐骨尾骨肌
- E. 球海绵体肌, 坐骨海绵体肌, 会阴深横肌

参考答案: A

B型题

- A. 阴阜

- B. 阴蒂

- C. 前庭球

- D. 阴道前庭

- E. 大阴唇

- 11. 外伤时易形成血肿

- 12. 耻骨联合前面隆起的脂肪垫

参考答案: 83. E 84. A

- A. 高柱状上皮

- B. 有纤毛的高柱状上皮

- C. 鳞状上皮化生

- D. 复层鳞状上皮

- E. 生发上皮

- 13. 阴道粘膜是

- 14. 子宫颈管粘膜是

- 15. 输卵管粘膜是

参考答案：85:D 86:A 87:B

- A. 髂总动脉
- B. 肾动脉
- C. 腹主动脉
- D. 髂内动脉前干分支
- E. 髂内动脉前干终支
- 16. 阴道动脉来自
- 17. 阴部内动脉来自
- 18. 子宫动脉来自
- 19. 卵巢动脉来自

参考答案：16:D 17:E 18:D 19:C

第二单元 女性生殖系统生理

1. 关于卵巢的生理正确的是

- A. 卵泡期一般是固定的
- B. 随着卵泡的逐渐发育与成熟，宫颈粘液量由多变少
- C. 排卵后阴道上皮细胞加速脱落
- D. 排卵后由于孕激素的作用，基础体温呈低温相
- E. 排卵后孕酮分泌增加，输卵管峡部肌肉收缩。

参考答案：C

2. 卵子自卵巢排出后未受精，黄体开始萎缩是在排卵后的

- A. 4~5天
- B. 9~10天
- C. 11~12天
- D. 13~14天
- E. 15~16天

参考答案：B

3. 28岁，月经周期为28天，有排卵的妇女于月经周期第17天刮宫，子宫内膜镜检属于

- A. 增生早期
- B. 增生晚期
- C. 分泌早期
- D. 分泌晚期
- E. 排卵期

参考答案：C

4. 月经周期为32天的妇女，其排卵日应在月经来潮后的

- A. 第10天
- B. 第12天
- C. 第15天
- D. 第18天
- E. 第21天

参考答案：D

5. 下列检查卵巢功能准确性最高的方法是

- A. B超检查
- B. 阴道细胞学检查
- C. 基础体温测定
- D. 子宫内膜病理检查
- E. X线检查

参考答案：D

6. 下列哪项检查不能反映雌激素分泌水平

- A. 宫颈粘液干燥后形成羊齿状结晶
- B. 尿雌三醇测定
- C. 子宫内膜呈增殖期变化
- D. 阴道脱落细胞中大部份为角化细胞
- E. 基础体温高温相

参考答案：E

7. 关于月经下述哪项是正确的

- A. 月经周期的长短主要与卵泡期有关
- B. 月经血可凝固，多伴有小血块
- C. 月经来潮表明卵巢有排卵，且未发生受精和孕卵着床
- D. 月经时子宫内膜从基底层脱落
- E. 正常月经量约100ml

参考答案：A

8. 下述哪种激素能使阴道上皮细胞所含糖原在阴道杆菌作用下形成乳酸，起阴道自净作用

- A. 促性腺激素释放激素
- B. 垂体促性腺激素
- C. 促甲状腺激素
- D. 雌激素
- E. 孕激素

参考答案: D

9. 雌激素对丘脑下部及脑垂体前叶的反馈是
A. 雌激素-负反馈 孕激素-正反馈
B. 雌激素-正反馈 孕激素-负反馈
C. 雌激素-负反馈 孕激素-负反馈
D. 雌激素-正反馈 孕激素-负反馈
E. 雌激素-负反馈 孕激素-正反馈

参考答案: D

10. 卵巢排卵后形成黄体, 此时孕激素分泌旺盛, 其高峰在月经周期的
A. 第 7-8 天
B. 第 12-13 天
C. 第 17-18 天
D. 第 22-23 天
E. 第 25-26 天

参考答案: D

11. 下述各项中哪项是正确的
A. 绝经后妇女卵巢功能衰退, 体内无雌激素
B. 妇女有月经来潮即说明有排卵
C. 卵巢只分泌雌、孕激素
D. 垂体激素不属于类固醇激素
E. 孕激素是雄激素的前身物质

参考答案: E

12. 下列哪项检查结果可反映出雌激素水平
A. 宫颈粘液出现羊齿状结晶
B. 尿中孕二醇值增多
C. 基础体温呈高温相
D. 子宫内膜呈分泌期变化
E. 阴道上皮细胞多为中层细胞或角化前细胞

参考答案: A

13. 子宫内膜由增殖期变为分泌期, 主要是受哪种激素的作用
A. 雌激素
B. 孕激素
C. 促卵泡素 (FSH)
D. 促黄体素 (LH)
E. 促性腺激素释放激素 (GnRH)

参考答案: B

14. 在以下各项中, 哪项是雌激素和孕激素协同作用的
A. 子宫收缩
B. 乳房发育
C. 输卵管蠕动
D. 子宫颈粘液的变化
E. 基础体温上升

参考答案: B

15. 反映卵巢有排卵功能的检查为
A. 基础体温单相型
B. 阴道脱落细胞反映为轻度雌激素影响
C. 宫颈粘液有羊齿状结晶
D. 子宫内膜呈增殖期变化
E. 子宫内膜呈分泌期变化

参考答案: E

B型题

- A. 促卵泡素
B. 促黄体素
C. 雌激素
D. 孕激素
E. 泌乳素

16. 卵泡早期分泌量少, 其后逐渐增高, 排卵前达高峰以后降低, 黄体期再度升高

17. 卵泡前半期分泌少, 以后逐渐上升, 排卵前 24 小时迅速升高出现分泌陡峰, 24 小时后骤降, 黄体期维持低水平

18. 卵泡早期血含量甚微, 排卵后分泌量显著增加, 7-8 天后逐渐下降

参考答案: 16:C 17:B 18:D

第三单元 妊娠生理

1. 下述妊娠期母体生理变化错误的是

- A. 黄体功能于孕 10 周后由胎盘取代
B. 不哺乳者垂体生乳素产生后 3 周内降至非孕时水平
C. 由于胰岛素分泌减少, 孕妇易患糖尿病
D. 肾盂肾炎和胆石症发作与高水平孕激素有关
E. 妊娠 32-34 周时心搏出量及血容量达高峰

参考答案：C

2. 关于妊娠期母体生殖系统的变化，哪项是错误的
A. 子宫于妊娠12~14周出现不规则无痛性收缩，称Braxton Hick 收缩
B. 阴道粘膜增厚，变软，皱褶增多，伸展性增加
C. 妊娠早期可见妊娠黄体，约在孕10周后开始萎缩
D. 妊娠早期乳房增大，乳头变黑，易勃起
E. 近预产期时宫颈变短，鳞柱状上皮交界处内移，出现糜烂面

参考答案：E

3. 关于脐带，哪项是错误的
A. 妊娠足月(40周末)脐带长度一般为50cm
B. 脐带有两根脐动脉和一根脐静脉
C. 脐带表面由羊膜包围
D. 脐静脉的氧分压低于脐动脉
E. 脐带杂音的速率与胎心音率同

参考答案：D

4. 正常妊娠40周的羊水量约为
A. 500ml以下
B. 500~800ml
C. 800ml
D. 1500ml
E. 2000ml

参考答案：C

5. 卵子受精是在输卵管的哪个部位
A. 伞部
B. 壶腹部与峡部联接处
C. 峡部与间质部联接处
D. 间质部内
E. 内侧1/3处

参考答案：B

6. 妊娠后半期羊水的主要来源是
A. 羊膜的透析
B. 胎儿皮肤的透析
C. 胎儿呼吸道粘膜的透析
D. 胎儿尿液
E. 脐带表面的透析

参考答案：D

7. 关于受精卵发育与植入，正确的是
A. 精子到达输卵管与卵子相遇，顶体外膜破裂释出顶体酶，称为精子获能
B. 获能的精子穿透初级卵母细胞的透明带，为受精的开始
C. 孕卵植入后蜕膜产生“早孕因子”，抑制母体淋巴细胞活性
D. 妊娠期的子宫内膜称为蜕膜
E. 囊胚与子宫肌层间的蜕膜为真蜕膜

参考答案：D

8. 妊娠期子宫的变化，正确的是

- A. 足月妊娠时子宫血流量约为300~500ml/分
B. 足月妊娠子宫血流量70~75%供应胎盘，20~25%供应子宫蜕膜层
C. 妊娠期Braxton Hicks 收缩，宫内压力约为30mmHg
D. 子宫肌细胞肥大，胞浆内充满具有收缩活性的肌动蛋白与肌球蛋白
E. 子宫肌壁厚度由非孕时的约1cm至足月时增加一倍

参考答案：D

解析：妊娠足月时子宫血流量为450~650 ml/分，其中5%供肌层，10~15%供应子宫蜕膜层，80%~85%供应胎盘。

妊娠期无痛性宫缩称为Braxton Hicks 收缩，特点为自妊娠12~14周期出现不规律、无痛性宫缩，宫腔内压通常为5~25 mmHg，持续不到30秒。

9. 胎儿血液循环建立是在受精后的

- A. 第1周
B. 第2周
C. 第3周
D. 第4周
E. 第5周

参考答案：C

10. 关于绒毛膜促性腺激素，哪项是正确的

- A. 来自蜕膜，绒毛膜与羊膜的上皮细胞
B. 为一种糖蛋白激素，有a.b两侧链，a亚单位有特异性

- C. 受孕后 9-13 天 HCG 明显升高, 孕 8-10 周达最高峰以后迅速下降
- D. 在妊娠早期替代垂体 FSH 功能, 促使妊娠黄体发育
- E. 测定血 HCG 可作为上皮性恶性肿瘤的监测标记

参考答案: C

- 11. 正常妊娠满 28 周末的胎儿体重大致为

- A. 500 克
- B. 1000 克
- C. 1500 克
- D. 2000 克
- E. 2500 克

参考答案: B

- 12. 妊娠期间子宫的变化, 正确的是

- A. 足月的宫腔容量增加 20 倍, 为 1000ml
- B. 足月的子宫重量增加 10 倍, 为 500 克
- C. 肌细胞于早期增生, 数目增加
- D. 子宫下段于怀孕后期增长速度最快
- E. 子宫下段于临产时可伸展至 7-10 厘米

参考答案: E

- 13. 妊娠期母体心血管系统的变化, 正确的是

- A. 心脏向左下方移位
- B. 孕期心脏听诊闻及收缩期杂音可诊断为心脏异常
- C. 孕妇心搏量对活动的反应与非孕期相同
- D. 收缩压无明显变化, 舒张压稍偏低
- E. 下肢静脉压无明显变化

参考答案: D

- 14. 妊娠期孕妇泌尿系统变化, 正确的是

- A. 泌尿系统肌张力降低
- B. 输尿管蠕动增加
- C. 孕妇易发生左侧肾盂肾炎
- D. 夜尿量少于日尿量
- E. 肾小管对葡萄糖再吸收能力相应增加

参考答案: A

- 15. 孕妇血容量变化, 哪项是正确的

- A. 自妊娠 12 周血容量开始增加
- B. 妊娠 32-34 周达高峰
- C. 34 周后缓慢增加至足月
- D. 红细胞增加多于血浆增加
- E. 孕中期血液处于浓缩状态

参考答案: B

- 16. 胎盘的构成是由以下哪项组成

- A. 羊膜, 包蜕膜, 叶状绒毛膜
- B. 羊膜, 底蜕膜, 滑泽绒毛膜
- C. 羊膜, 真蜕膜, 叶状绒毛膜
- D. 羊膜, 滑泽绒毛膜, 包蜕膜
- E. 羊膜, 叶状绒毛膜, 底蜕膜

参考答案: E

第四、五单元 妊娠诊断及孕期监护与孕期保健

- 1. 早孕诊断哪项是错误的

- A. 子宫增大变软, 呈球形
- B. 阴道及子宫颈呈紫蓝色
- C. 黑格尔氏 (Hegar's sign) 试验阳性
- D. 黄体酮试验阳性
- E. 尿 HCG 阳性

参考答案: D

- 2. 早孕出现最早及最重要的症状是

- A. 停经史
- B. 恶心呕吐
- C. 尿频
- D. 腹痛
- E. 乳房胀痛

参考答案: A

- 3. 确定早孕最可靠的辅助方法是

- A. 妇科内诊
- B. 妊娠免疫试验
- C. B 超检查
- D. 阴道脱落细胞学检查
- E. 测定尿中孕二醇值

参考答案: C

- 4. 孕妇开始自觉胎动的时间是

- A. 妊娠 12-16 周
- B. 妊娠 18-20 周
- C. 妊娠 22-24 周
- D. 妊娠 25-26 周
- E. 妊娠 27 周以上

参考答案：B

5. 关于胎心音正确的是

- A. 妊娠 18-20 周用一般听筒可经孕妇腹壁听到
- B. 为单音响吹风样杂音
- C. 妊娠 24 周以后，在胎儿肢体侧听得最清楚
- D. 多伴有杂音
- E. 胎心率与孕妇心率近似

参考答案：A

6. 在孕妇腹壁上听诊，与胎心率一样的音响是

- A. 腹主动脉音
- B. 脐带杂音
- C. 子宫杂音
- D. 胎动杂音
- E. 胎盘血流杂音

参考答案：B

7. 目前国内统一的围生期的时间范围是

- A. 妊娠 20 周至产后 1 周
- B. 妊娠 20 周至产后 2 周
- C. 妊娠 28 周至产后 1 周
- D. 妊娠 28 周至产后 2 周
- E. 妊娠 28 周至产后 4 周

参考答案：C

8. 下列哪组方法诊断妊娠最可靠

- A. 停经史，胎动感，腹部渐膨隆
- B. 停经史，内诊子宫增大，B 超见宫内胎囊、胎芽、胎心，尿 HCG (+)
- C. 停经史，早孕反应，内诊子宫增大，尿 HCG (+)
- D. 停经史，早孕反应，B 超见宫内光团
- E. 早孕反应，内诊子宫增大，附件囊性小包块，尿 HCG (+)

参考答案：B

9. 24 岁初产妇，末次月经记不清，行产科检查，量腹围 94cm，宫高 33cm，（宫底在脐与剑突之间），胎头入盆，胎心位于脐右下方，其孕周为

- A. 孕 24 周
- B. 孕 28 周
- C. 孕 32 周
- D. 孕 36 周
- E. 孕 40 周

参考答案：E

10. 停经三个月，子宫大于孕月，鉴别正常妊娠，多胎，异常妊娠的最好方法是

- A. 腹部 X 线摄片
- B. 超声多普勒检查
- C. B 超检查
- D. 胎儿心电图检查
- E. 羊水甲胎蛋白测定

参考答案：C

11. 月经规律妇女常用推算预产期的方法是

- A. 自末次月经干净之日起
- B. 自末次月经开始之日起
- C. 初觉胎动的时间
- D. 早孕反应开始的时间
- E. 孕早期妇科检查时子宫大小

参考答案：B

12. 一产妇孕 36 周，产前检查胎背位于母体腹部左侧，胎心位于左上腹，宫底可触及浮球感，诊断胎方位为

- A. LOA
- B. LOT
- C. LSA
- D. RSA
- E. LOP

参考答案：C

14. 25 岁妇女，即往月经规律，停经 50 天，近三天晨起呕吐，厌油食，伴有轻度尿频，仍坚持工作，可能的诊断是

- A. 病毒性肝炎
- B. 膀胱炎
- C. 继发性闭经

D. 妊娠剧吐

E. 早期妊娠

参考答案: E

15. 孕妇 30 岁, 第二胎孕 39 周, 临产 12 小时, 宫口开全 1 小时, 胎头未下降, 腹部检查, 胎儿肢体在右前方明显触及, 胎背在左后方, 耻骨联合上触及胎头, 不能推动, 额隆突明显, 此时阴道检查可以出现

A. 胎头矢状缝与骨盆横径一致, 后囟在左方

B. 胎头矢状缝与骨盆横径一致, 后囟在右方

C. 胎头矢状缝与骨盆斜径一致, 后囟在左方

D. 胎头矢状缝与骨盆斜径一致, 后囟在右方

E. 胎头矢状缝与骨盆前后径一致, 后囟在后方

参考答案: C

16. 关于胎儿成熟度的判定正确的是

A. 羊水卵磷脂与鞘磷脂比值(L/S 比值) ≥ 2 , 提示胎肺成熟

B. 羊水肌酐测定 = 1 mg% 为肾成熟

C. 羊水胆红素 $> 0.02 (\Delta OD 450)$ 示胎儿肝脏成熟

D. 羊水脂肪细胞出现率 $< 10\%$ 示胎儿皮肤成熟

E. 超声波测胎头双顶径 = 7.5 cm, 提示胎儿成熟

参考答案: A

17. 关于胎动次数, 下述哪项提示胎儿缺氧

A. 胎动 < 10 次/12 小时

B. 胎动 < 15 次/12 小时

C. 胎动 < 20 次/12 小时

D. 胎动 < 25 次/12 小时

E. 胎动 < 30 次/12 小时

参考答案: A

18. 关于胎儿电子监测, 提示脐带受压的是

A. NST 无反应型

B. 加速

C. 早期减速

D. 变异减速

E. 晚期减速

参考答案: D

22. 高危妊娠时选择终止妊娠的时间应取决于

A. 宫颈成熟度

B. 宫底高度

C. 胎动次数

D. 胎盘功能和胎儿成熟度

E. 胎儿电子监测

参考答案: D

23. 胎盘功能检查方法不包括

A. 尿雌三醇测定

B. 尿雌激素 / 肌酐 (E/C) 比值

C. 血清胎盘生乳素 (hPL) 值

D. 羊水脂肪细胞出现率

E. 缩宫素激惹试验

参考答案: D

24. 提示胎儿宫内缺氧的检查结果是

A. 无激惹试验出现胎动时伴胎心加速

B. 缩宫素激惹试验 (+)

C. 胎儿头皮血 pH 值为 7.30

D. 胎动 15 次/12 小时

E. 胎心监护出现 FHR 早期减速

参考答案: B

25. 下述哪项说明胎盘功能低下

A. 妊娠 32 周后, 尿雌三醇连续多次均 $> 10 \text{ mg}/24 \text{ 小时}$

B. OCT 试验阴性

C. 妊娠 35 周后血清 hPL $< 4 \mu \text{g}/\text{ml}$

D. 尿雌激素 / 肌酐 比值 > 15

E. NST 试验为有反应性

参考答案: C

26. 第一胎妊娠 43 周无产兆, 检查: 宫高 33 cm, LOA, 胎头入盆, 胎心 128 次/分, 两周前尿 E

3 测定为 $18 \text{ mg}/24 \text{ 小时}$, 今日测为 $8 \text{ mg}/24 \text{ 小时}$, 应考虑为

A. 胎儿宫内窘迫

B. 胎头受压

C. 脐带受压

D. 胎儿过度成熟

E. 胎盘功能减退

参考答案: E

27. 孕妇,32岁,G3P0因孕过期入院待产,检查:血压16/10.7kPa(120/80mmHg),宫高35cm,胎位LOA,胎心130次/分,拟行胎盘功能测定,下列哪项表示胎盘功能减退

- A. 12小时胎动次数≥20次
- B. 超羊水池最大直径≥3cm
- C. 血清胎盘生乳素≥4μg/L
- D. NST试验有反应型
- E. OCT试验胎心出现连续晚期减速

参考答案: E

28. 骨盆出口横径<8cm应进一步测量哪条经线

- A. 骶耻外经
- B. 骨盆出口后矢状经
- C. 坐骨棘间经
- D. 耻骨弓角度
- E. 坐骨切迹宽度

参考答案: B

29. 妇女站立时骨盆入口平面与地平面的角度称骨盆倾斜度,正常值应为

- A. 65°
- B. 60°
- C. 55°
- D. 50°
- E. 70°

参考答案: B

30. 常染色体显性遗传病夫妻一方患病子女预期风险率

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 1/8
- D. 1/16
- E. 不定

参考答案: B

31. 下列哪种检查方法不能用于遗传筛查:

- A. 羊水检查
- B. B型超声检查
- C. 羊膜镜检查
- D. 磁共振成像
- E. 绒毛活检

参考答案: C

32. 关于胎儿电子监测哪一项是错误的:

- A. 能连续观察胎心率的动态变化
- B. 受宫缩影响
- C. 可同时记录宫缩、胎心、胎动变化
- D. 对母儿均无影响
- E. 是监测胎儿宫内安危的一项重要指标

参考答案: B

33. B型超声检查从妊娠22周起胎儿双顶径每周约增加:

- A. 0. 1cm
- B. 0. 12cm
- C. 0. 20cm
- D. 0. 22cm
- E. 0. 25cm

参考答案: D

34. 下列哪项不属于高危儿

- A. 手术产儿
- B. 出生体重<2500g
- C. 孕龄<37周或≥42周
- D. 妊高征产妇的新生儿
- E. 生后1分钟内Apgar评分为5分

参考答案: E

35. 孕妇骨盆外测量数值最小的是

- A. 髂嵴间径
- B. 髂棘间径
- C. 骶耻外径
- D. 出口后矢状径
- E. 坐骨结节间径

参考答案: D

B型题

- A. 孕8周
- B. 孕16周
- C. 孕20周
- D. 孕28周

- E. 孕 40 周
 36. 围产期计算的开始时间
 37. 胎儿体重约 1000 克左右
 38. 胎儿身长 16cm, 外生殖器可确定性别
 参考答案: 36:D 37:D 38:B
- A. 羊水泡沫试验
 B. 羊水肌酐测定
 C. 羊水胆红素测定
 D. 羊水脂肪细胞出现率
 E. 羊水细胞学检查
 39. 测定胎儿肾成熟度
 40. 了解胎儿肺成熟度
 41. 提示胎儿皮肤成熟
 参考答案: 39:B 40:A 41:D
- A. 早期减速
 B. 变异减速
 C. 晚期减速
 D. 催产素激惹试验(-)
 E. 无激惹试验有反应型
 42. 脐带受压
 43. 胎头受压
 44. 胎盘功能减退
 参考答案: 42:B 43:A 44:C
- A. 羊水 L/S 比值
 B. 羊水甲胎蛋白测定
 C. 羊水细胞培养
 D. 羊膜腔造影
 E. 羊水肌酐值
 45. 胎儿肺成熟度
 46. 开放性神经管缺陷
 47. 胎儿宫内染色体病诊断
 参考答案: 45:A 46:B 47:C
- A. 最先进入骨盆入口的胎儿部份
 B. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
 C. 胎体纵轴与母体纵轴的关系
 D. 胎儿身体各部分的相互关系
 E. 胎儿位置与母体骨盆的关系
 48. 胎先露
 49. 胎方位
 50. 胎产式
 51. 胎儿姿势
 参考答案: 48:A 49:B 50:C 51:D

第六单元 正常分娩

1. 临产开始的重要标志, 哪项是错误的
 A. 规律性宫缩, 持续 30 秒以上, 间歇 5-6 分钟左右
 B. 进行性子宫颈管展平消失
 C. 宫颈扩张
 D. 阴道出血性粘液
 E. 胎先露部下降
 参考答案: D
2. 关于枕左前位分娩机制, 正确的是
 A. 胎头矢状缝衔接于骨盆入口左斜径上
 B. 俯屈发生在胎头到达中骨盆时
 C. 内旋转动作完成于第一产程初
 D. 胎头下降至阴道外口时, 出现仰伸动作
 E. 胎头娩出后, 枕部向右方向旋转 45°, 是为复位
 参考答案: D
3. 枕前位胎头进入骨盆入口的衔接径线是
 A. 双顶径
 B. 双额径
 C. 枕下前囟径
 D. 枕额径
 E. 枕颏径
 参考答案: D
4. 枕左前位时, 胎头内旋转是使其矢状缝与下列哪个径相一致的动作
 A. 骨盆入口前后径
 B. 中骨盆前后径
 C. 骨盆出口前后径
 D. 中骨盆及骨盆出口前后径

E. 中骨盆横径

参考答案: D

5. 分娩即将开始的较可靠征象是

A. 阴道流出出血性粘液

B. 子宫底降低

C. 胎动活跃

D. 尿中绒毛膜促性腺激素增多

E. 先露已入盆

参考答案: A

6. 关于产程分期,正确的是

A. 第一产程,初产妇约为11-12小时

B. 第一产程经产妇约需8-10小时

C. 第二产程初产妇约需2-3小时

D. 第二产程经产妇约需1-2小时

E. 第三产程初产妇与经产妇均需40分钟左右

参考答案: A

7. 关于正常分娩第一产程的临床经过正确的是

A. 自然破膜多发生于胎头衔接于骨盆入口处时

B. 生理缩复环有时可达脐上一横指

C. 初产妇多是子宫颈管先展平,子宫颈外口后扩张

D. 喘产妇于宫缩时加用腹压

E. 宫口扩张4cm时开始记录产程图

参考答案: C

8. 下列哪项不是临产后肛查的目的

A. 了解宫颈扩张程度

B. 了解胎方位

C. 了解是否有脐带先露

D. 了解胎先露下降程度

E. 了解骨盆腔大小

参考答案: C

9. 第三产程,胎盘剥离征象哪项是正确的

A. 子宫底升至脐上,子宫体变硬呈球形

B. 阴道有大量出血

C. 子宫轮廓不清,质软

D. 阴道口外露的脐带长度缩短

E. 轻压子宫下段时,外露脐带有回缩

参考答案: A

10. 胎儿娩出10分钟,阴道出血200ml作何处理

A. 牵拉脐带

B. 按摩子宫

C. 快速娩出胎盘

D. 检查会阴伤口

E. 肌肉注射宫缩剂

参考答案: C

11. 下述哪项是错误的产程时间

A. 初产妇第一产程约需11-12小时

B. 初产妇第二产程约需1-2小时

C. 第三产程约需5-15分钟

D. 第二产程超过2小时为延长

E. 总产程超过28小时为滞产

参考答案: E

12. 25岁初产妇,孕足月,一年前有流产史,胎儿顺利娩出约4分钟后出现阴道暗红色间歇流血,约15ml,首先应考虑的原因是

A. 颈管裂伤

B. 阴道静脉破裂

C. 血凝障碍

D. 胎盘嵌顿

E. 正常位置胎盘剥离

参考答案: E

13. 初产妇枕先露时,开始保护会阴的时间应是

A. 宫口开全时

B. 胎头可以见到时

C. 胎头拨露使阴唇后联合紧张时

D. 胎头着冠时

E. 胎头复位时

参考答案: C

14. 孕38周第一胎,有规律宫缩5小时,阴道流水6小时,宫口开大5cm,双顶径处在坐骨棘水平,阴道分泌物PH为7,胎心正常,正确的诊断和处理是

A. 因胎膜早破,抬高床尾

- B. 系正常第一产程，灌肠以促进宫缩
- C. 等待自然分娩
- D. 剖宫产
- E. 静点催产素引产

参考答案：C

15. 如果做胎心监护，下列哪项外，均有助于诊断

- A. 胎心率无反应型
- B. 胎心晚期减速
- C. 胎心变异减速
- D. 胎心基线缺乏变异
- E. 胎心率减慢

参考答案：A

16. 临产 18 小时，宫口已开全，先露部 S+1，胎心持续在 165 次/分，此时最恰当的处理应

- A. 左侧卧位，面罩吸氧
- B. 立即剖宫产
- C. 静注葡萄糖，维生素 C 及尼可刹米
- D. 静注 5% 碳酸氢钠
- E. 阴道助产分娩

参考答案：E

B型题

- A. 左枕前
- B. 右枕前
- C. 左枕横
- D. 左枕后
- E. 右枕后

17. 胎头矢状缝在骨盆入口右斜径上，小囟门在骨盆的左前方

18. 胎头矢状缝在骨盆入口右斜径上，大囟门在骨盆的左前方

参考答案：17:A 18:E

第七单元 正常产褥

1. 下列哪项符合正常产褥期子宫复旧的规律
- A. 产后 30 天，子宫恢复正常大小
 - B. 产后 4 周时宫颈完全恢复正常状态
 - C. 产后 4 天时宫颈内口关闭
 - D. 产后一周，子宫于腹部不可扪及
 - E. 产后子宫底每天下降 3cm

参考答案：B

2. 产褥期是指产后

- A. 2 周
- B. 4 周
- C. 6 周
- D. 8 周
- E. 12 周

参考答案：C

3. 初乳与成熟乳比较，正确的是
- A. 初乳中含是较多蛋白质，主要是白蛋白
 - B. 初乳及成熟乳中，均含有大量免疫球蛋白 IgA
 - C. 初乳中脂肪及糖类含量较高
 - D. 初乳持续约 3 天以后，逐渐变为成熟乳汁
 - E. 大多数药物不经母血渗入乳汁中

参考答案：B

4. 关于产褥期血液系统变化，正确的是

- A. 产褥早期血液即转为低凝状态
- B. 纤维蛋白原、凝血酶原于产后 3-4 周内降至正常
- C. 产褥早期，白细胞总数达 $30 \times 10^9 /L$ ，中性增多
- D. 红细胞计数及血红蛋白值逐渐增多
- E. 血沉于产后 1-2 周降至正常

参考答案：D

5. 产妇产后内分泌系统改变哪项不正确
- A. 产后一周雌孕激素水平恢复到孕前水平
 - B. 胎盘分泌的 HPL 产后 6 小时内消失
 - C. 肾上腺皮质功能产后 4 天恢复正常
 - D. 血 HCG 产后一个月才能消失
 - E. 产后 6 周 FSH 逐渐恢复

参考答案：D

6. 下列哪项产褥期临床表现是错误的

- A. 产后 24 小时内体温略升高但不超过 38°C
- B. 产后 3-4 日可能会出现“泌乳热”
- C. 产后第 2 日开始宫底每日下降 1-2cm

D 产后子宫收缩引起宫缩痛

E 恶露持续一周

参考答案：E

7. 会阴伤口的处理不正确的是

A 每日2次2%苯扎溴铵溶液擦洗外阴

B 会阴缝线产后3-5日拆线

C 产后外阴压迫性水肿数日内可自行消退

D 会阴伤口感染应延迟拆线

E 会阴伤口不能如期愈合有感染者应定期换药

参考答案：D

A. 产后6周

B. 产后8周

C. 产后10周

D. 产后4周左右

E. 产后30天

8. 产后子宫完全复旧的时间

9. 产后子宫内膜完全修复的时间

10. 产后子宫内口关闭时间

11. 不哺乳产妇平均恢复排卵时间

参考答案：8:A 9:A 10:D 11:C

第八单元 病理妊娠

31岁，G3P1孕36周，头痛视物不清，面部浮肿2天，今晨头痛加剧，恶心、呕吐3次。就诊时突然牙关紧闭，双眼上吊，面部肌肉抽动，四肢肌肉强直，随后剧烈抽搐约1分钟渐清醒，即测血压195/120mmHg，胎心120次/分，有不规则宫缩，肛查：宫口未开，儿头S-2，骨产道正常。

1. 突然抽搐应诊断为

A. 脑出血

B. 高血压危象

C. 子痫

D. 癫痫

E. 癫痫

参考答案：C

2. 首选紧急处理为

A. 肌注654-2

B. 静脉推注肼苯哒嗪

C. 静脉滴注甘露醇

D. 静脉滴注硫酸镁，镇静剂

E. 肌内注射安定

参考答案：D

3. 为估计病情严重程度，哪项检查最常用而最有参考价值

A. 脑CT检查

B. 眼底检查

C. 心电图检查

D. 胎心监护

E. 腹部B超检查

参考答案：B

4. 入院治疗6小时末再抽搐，血压195/120-180/105mmHg，产科最恰当的处理是

A. 积极解痉，镇静，防止再次抽搐

B. 治疗24-48小时，血压控制不满意即终止妊娠

C. 即人工破膜，催产素静脉点滴引产

D. 即刻剖宫产终止妊娠

E. 进入第二产程后应予以助产

参考答案：D

5. 关于羊水过多哪项不正确

A. 慢性羊水过多常发生在妊娠28-32周

B. 1/3羊水过多病因不明

C. 多数羊水重度过多与胎儿畸形有关

D. 妊娠合并糖尿病可合并羊水过多

E. 羊水量>3000ml为过多

参考答案：E

6. 下列哪项不是胎膜早破的原因

A. 生殖道病原微生物上行感染

B. 铜元素缺乏胎膜抗张能力下降

C. 高龄初产

D. 宫颈内口松弛

E. 头盆不称致前羊水囊受压不均

参考答案：C

7. 关于过期妊娠哪项是不正确的

A. 过期妊娠胎盘功能可以正常

B. 10%-20%并发胎儿成熟障碍

- C 新生儿窒息发生率高
D 成熟障碍分三期，期别越高预后越差
E 确诊过期妊娠如无胎儿宫内窘迫和头盆不称可引产。

参考答案：D

8. 诊断前置胎盘最可靠而安全的方法是
A. X线腹部平片
B. 凝血功能检查
C. B超检查
D. 阴道内诊
E. 双下腹可闻胎盘杂音

参考答案：C

9. 前置胎盘最主要的症状是
A. 多在妊娠早期出现阴道间断性出血
B. 妊娠晚期无痛性反复阴道出血
C. 完全性前置胎盘通常出血量不多
D. 出血量与前置胎盘类型无关
E. 常易造成胎膜早破

参考答案：B

10. 足月妊娠，阴道出血，为明确诊断入院后应立即行
A. 肛门检查
B. 放射性同位素扫描法检查
C. 胎儿电子监测
D. B超检查
E. 阴道检查

参考答案：D

11. 35岁，孕39周，G1P0 无痛性阴道出血5小时，1小时前出现规律宫缩阴道出血量明显增多，腹部检查ROA，胎头高浮，胎心160次/分，阴道检查宫口开大1cm，本例最适当的处理是

- A. 给大剂量止血剂
B. 等待自然分娩
C. 人工破膜行头皮钳牵引胎头
D. 静脉点滴催产素
E. 剖宫产

参考答案：E

12. 初产妇，妊娠28周，半夜睡醒发现自己卧在血泊之中，入院呈休克状态，阴道出血稍减少，最可能的诊断是

- A. 边缘性前置胎盘
B. 部分性前置胎盘
C. 完全性前置胎盘
D. 胎盘早剥
E. 子宫破裂

参考答案：C

13. 妊娠37周，G2P0 双胎妊娠（头、臀），伴阵发性腹痛3小时，阴道出血2小时如月经量，半小时前阴道流水色清。查：ROA/LSA，胎心128-132次/分，先露浅入，于耻骨上可闻及与母体脉搏一样的吹风样杂音，宫缩30"/4-5'，最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
B. 帆状胎盘前置血管破裂
C. 完全性前置胎盘
D. 边缘性前置胎盘
E. 产程中正常现象

参考答案：D

14. 此例最可能的诊断是
37岁，结婚10年，G4P0 孕32周，人流2次，过期流产刮宫一次，阴道少量出血3天，不伴腹痛，体检：儿头高浮，胎心140次/分，耻骨联合上方可闻胎盘杂音

14. 此例最可能的诊断是

- A. 先兆流产
B. 前置胎盘
C. 胎盘早剥
D. 先兆子宫破裂
E. 胎盘边缘血窦破裂

参考答案：B

15. 处理原则中错误的是

- A. 卧床休息，吸氧，观察病情变化
B. 给予镇静保胎治疗
C. 配血备用
D. 即刻终止妊娠
E. 腹部B超检查

参考答案：D

16. 最恰当的处理是

- A. 即刻人工破膜

- B. 人工破膜及催产素静点
- C. 催产素引产
- D. 即刻剖宫产术
- E. 期待疗法

参考答案: E

- 17. 胎盘早剥的临床表现正确的是
- A. 主要症状是无痛性反复阴道出血
- B. 轻型早剥以隐性出血为主
- C. 重型早剥主要症状为突发性持续性腹痛
- D. 轻型早剥剥离面积不超过胎盘的 1/5
- E. 胎儿电子监测时出现早期剥离

参考答案: C

- 18. 初产妇已确诊重型胎盘早剥, 宫口开大 4cm, 最恰当的处理方式是
- A. 即刻剖宫产术
- B. 人工破膜术
- C. 静脉点滴催产素加速产程
- D. 人工破膜及催产素静脉点滴
- E. 头皮牵引术

参考答案: A

- 19. 胎盘早剥典型的表现, 下列哪项是错误的
- A. 腹痛伴阴道出血
- B. 肉眼血尿
- C. 全身症状与外出血不成比例
- D. 血性羊水
- E. 宫底升高

参考答案: B

- 20. 重型胎盘早剥与先兆子宫破裂在临床表现上所共有的特征是
- A. 伴有头盆不称
- B. 合并妊娠高血压综合征
- C. 剧烈腹痛
- D. 子宫不放松
- E. 出现病理缩复环

参考答案: C

- 21. 关于胎盘早剥时的处理原则正确的是
- A. 纠正休克, 足量补液
- B. 确诊为轻型早剥者可期待疗法
- C. 产妇病情恶化, 不论胎儿是否存活均应及时行剖宫产术
- D. 需经阴道分娩者, 不宜行人工破膜
- E. 应及早使用肝素预防凝血功能障碍

参考答案: C

- 22. 下列哪项不是胎盘早剥所致的并发症
- A. 产后出血
- B. 胎盘植入
- C. DIC 及凝血功能障碍
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 席汉氏综合征

参考答案: B

- 23. 孕 38 周, 诊断为胎盘早剥行剖宫产术, 术中见子宫色紫质软, 胎儿胎盘娩出后, 大量出血, 注射宫缩剂并按摩子宫出血不止, 血压下降, 应立即给予
- A. 子宫切除
- B. 继续按摩子宫加热敷
- C. 止血药物
- D. 宫腔填塞
- E. 大量输血等待血压上升

参考答案: A

- 24. 初产妇孕 38 周, 自感腹痛伴阴道少量出血 2 小时, 检查: 血压 160/110mmHg, 下肢水肿(++) , 尿蛋白(+++), 子宫硬如板状, 胎位欠清晰, 胎心音未闻及, 肛查宫颈口未开。最可能的诊断是

- A. 重度子痫前期
- B. 重度子痫前期合并胎盘早剥
- C. 重度子痫前期先兆临产
- D. 先兆子宫破裂
- E. 前置胎盘

参考答案: B

- 28 岁, 第一胎, 孕 37 周合并妊娠期高血压病, 血压 20/13kPa(150/112mmHg) , 住院治疗 2 天突然血压下降至 8/5kPa(60/40mmHg) , 脉搏 120 次/分, 初步确诊为“胎盘早剥”

- 25. 下列哪项体征最具诊断价值

- A. 阴道多量出血
- B. 宫底升高, 宫体硬如板状, 胎心消失

- C. 耻骨联合上缘可闻胎盘杂鸣音
- D. 儿头高浮
- E. 子宫下段压迫明显

参考答案: B

26. 此患者不需要做的辅助检查是

- A. DIC过筛试验
- B. 纤维蛋白原定量检查
- C. 血小板计数及凝血时间
- D. 肾功能检查
- E. 脑电图

参考答案: E

27. 应采取恰当的处理是

- A. 抢救休克等待分娩
- B. 抢救休克尽快剖宫产术
- C. 人工破膜及催产素静点
- D. 人工破膜待宫口开大产钳助产
- E. 扩张宫口剥膜后人工破膜

参考答案: B

B型题

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早期剥离
- C. 子宫破裂
- D. 胎膜早破
- E. 脐带脱垂

28. 严禁行肛门检查

29. 重度子痫前期易发生

30. 膀胱破裂后最易发生

参考答案: 28:A 29:B 30:E

第九单元 妊娠合并症

1. 心脏病孕妇最危险的时期是

- A. 妊娠 35-38 周
- B. 妊娠 32-34 周
- C. 妊娠 24-27 周
- D. 妊娠 28-31 周
- E. 产褥期 7 天之后

参考答案: B

2. 关于妊娠合并心脏病孕妇的分娩期处理, 正确的是

- A. 应行剖宫产术
- B. 应缩短第二产程
- C. 忌用吗啡
- D. 无感染者不需使用抗生素
- E. 为预防产后出血, 应肌注麦角新碱

参考答案: B

3. 妊娠合并心脏病的孕妇产褥期的处理, 错误的是

- A. 产后一周内仍容易发生心力衰竭
- B. 产后应继续使用抗生素预防感染
- C. 凡属不宜再妊娠者, 应在产后第三天施行输卵管结扎术
- D. 产前待产时曾有过心力衰竭的孕妇, 产后仍需继续使用强心剂
- E. 心功能 III、IV 级者不宜哺乳

参考答案: C

4. 25岁,G1P0孕38周,风湿性心脏病,心功能I-II级,胎儿估计2700g,分娩期处理正确的

- A. 剖宫产术
- B. 应助产缩短第二产程
- C. 等待自然分娩
- D. 忌用吗啡
- E. 肌注麦角新碱预防产后出血

参考答案: B

5. 26岁足月妊娠并风湿性心脏病,心功能II级,胎头吸引助产,产后2小时阴道出血300ml,心率110次/分,双肺呼吸音清,宫底脐下2指,对该患者正确的治疗是

- A. 即开放静脉快速补液
- B. 即肌注麦角新碱0.2mg
- C. 西地兰0.2mg+25%葡萄糖20ml静脉推注
- D. 即肌注缩宫素10单位
- E. 无感染者产后不加用抗生素

参考答案: D

6. 37岁，第二胎孕20周，做家务劳动后感胸闷气短，近一周夜间经常咳嗽咯痰不能平卧，
检查：心率120次/分，心界向左扩大，心尖区可闻Ⅲ级收缩期杂音，双肺底闻小水泡音，双下肢浮肿

(+)，最适宜的处理是

- A. 加强产前监护
- B. 限制食盐摄入
- C. 立即终止妊娠
- D. 控制心衰继续妊娠
- E. 控制心衰后终止妊娠

参考答案：E

7. 25岁，因停经50天感心慌，胸闷诊为“先天性心脏病合并早孕”来院咨询是否可继续妊娠。查体：口唇，甲床轻度紫绀，血压正常，心率80次/分，律整，胸骨左缘第3-4肋间可闻I-II收缩期杂音，肺动脉瓣第二心音亢进，双肺呼吸音清，超声诊断：室间隔缺损伴肺动脉高压，下列医生的解答哪项是正确的

- A. 在心内科和产科医生治疗下维持妊娠至足月
- B. 不宜继续妊娠，入院行人工流产术
- C. 入院先行心脏手术，如心功能改善则继续妊娠
- D. 等待至孕中期行引产术
- E. 严密监护心功能，出现心衰即刻终止妊娠

参考答案：B

8. 妊娠合并病毒性肝炎错误的是

- A. 由于孕期的生理改变，如孕妇营养不良，肝脏易受病毒损害
- B. 甲型肝炎可经过胎盘传给胎儿
- C. 该病发生于妊娠早期，胎儿畸形的发生率增高
- D. 孕妇患肝炎后特别容易转成慢性肝炎
- E. 妊娠晚期，其诊断比非孕期困难

参考答案：B

9. 病毒性肝炎合并妊娠的处理，下列哪项是错误的

- A. 早期妊娠应行人工流产，中期妊娠一般不主张终止妊娠
- B. 近预产期应使用维生素K1并备新鲜血
- C. 应预防感染
- D. 产时应常规选用对肝脏无害的抗生素
- E. 临产期间应及时加用肝素预防DIC发生

参考答案：E

10. 妊娠合并肝炎对母儿的影响哪项不正确

- A. 发生于妊娠早期时可加重妊娠反应
- B. 孕早期病毒性肝炎的胎儿畸形发生率增高
- C. 孕晚期急性乙型肝炎者，约70%胎儿发生感染
- D. 母亲HBsAg阳性，新生儿全为阳性
- E. 易发生早产

参考答案：D

11. 妊娠合并病毒性肝炎时，在昏迷前期口服新霉素的目的是

- A. 预防肠道感染
- B. 抑制肠道内细菌生长，减少游离氨及其它毒性物质形成
- C. 杀伤病毒预防内源性感染
- D. 控制肝炎进展恶化
- E. 预防肝肾综合征的发生

答案：B

12. 妊娠8个月孕妇，25岁，近日患急性乙型肝炎，非常焦虑，担心胎儿被感染，故急切来我院门诊咨询部，母婴垂直传播几率

- A. 70%
- B. 50%
- C. 30%
- D. 25%
- E. 0%

参考答案：A

13. 关于妊娠期糖尿病哪项说法是错误的

- A OGTT试验其中任何两点超过正常值可确诊
- B 妊娠期糖尿病的发生率为1%-5%
- C 巨大儿发生率25%-42%
- D 不会发生胎儿宫内生长发育受限
- E 空腹血糖值≥5.6mmol/L应加用胰岛素治疗

参考答案：D

14. 下述哪种疾病与HPV感染关系不大

- A. 外阴尖锐湿疣
- B. 外阴癌
- C. CIN
- D. 卵巢癌

E 宫颈癌

参考答案: D

13. 有关淋病感染途径哪项错误

- A 成人主要是性接触
- B 幼女通常不会感染淋菌
- C 间接接触感染机会少
- D 胎儿主要在分娩时经产道时感染
- E 好发部位为2, 前庭大腺

参考答案: B

14. 淋病于妊娠期间治疗正确的是

- A 肌注青霉素效果佳
- B 多合并支原体感染应给予抗支原体药物
- C 临床症状消失为治愈
- D 青霉素过敏可选用喹诺酮类药物
- E 用药必须足量及时

参考答案: E

第十单元 遗传咨询、产前筛查、产前诊断

第十一单元 异常分娩

24岁, G1P0, 宫内孕40周, 破水24小时, 胎儿手脱出阴道口来诊。检查, 产妇腹痛拒按, 烦躁不安, 脉搏快, 呼吸快, 胎心160次/分。

1. 此时应首先考虑的诊断是:

- A 胎盘早剥
- B 前置胎盘
- C 子宫先兆破裂
- D 子宫不全破裂
- E 完全性子宫破裂

参考答案: C

2. 入院行体检时, 最有早期诊断意义的依据是:

- A 产妇疼痛难忍, 呼叫
- B 可见阴道内多量鲜血流出
- C 子宫轮廓不清, 胎体可清楚扪及
- D 肉眼血尿
- E 脐下病理缩复环随宫缩上升

参考答案: E

3. 最佳处理方法是:

- A 立即给予镇静剂
- B 乙醚麻醉下行内倒转术
- C 抗休克治疗
- D 立即剖宫产术
- E 立即消毒将手送回阴道内

4. 孕妇在做骨盆测量时, 发现坐骨棘间径<10cm, 坐骨结节间径<8cm, 耻骨弓角度<90°, 应属哪种类型骨盆

- A 扁平骨盆
- B 漏斗骨盆
- C 均小骨盆
- D 类人猿型骨盆
- E 骨软化病骨盆

参考答案: B

5. 初产妇临产后4小时胎头仍未入盆, 此时测量骨盆哪条径线

最有价值

- A 骶耻内径
- B 骶耻外径
- C 髂棘间径
- D 坐骨棘间径
- E 坐骨结节间径

参考答案: A

6. 当测量坐骨结节间径值<8cm时, 应进一步测量哪条径线

- A 坐骨切迹宽度
- B 坐骨结节间径
- C 对角结合径
- D 出口前矢状径
- E 出口后矢状径

参考答案: E

7. 中骨盆狭窄时主要会导致

- A 胎头跨耻征阳性
- B 持续性枕后位或枕横位
- C 胎膜早破
- D 胎位异常
- E 胎先露入盆受阻

参考答案: B

8. 以下哪项条件可给予试产机会
A. 轻度头盆不称
B. 明显头盆不称
C. 中骨盆横径狭窄
D. 中骨盆及出口平面狭窄
E. 出口横径与后矢状径之和<15cm

参考答案: A

9. 臀位阴道分娩时,在产程的处理中正确的是
A. 鼓励产妇离床活动,加速产程
B. 宫口开1-2cm时给予肥皂水洗肠
C. 一旦破水应立即听胎心
D. 宫缩时阴道口见胎足,提示已进入第二产程
E. 为避免破水时脐带脱垂,活跃期应充分堵臀

参考答案: C

10. 初产妇,孕足月规律宫缩8小时,宫口开大6cm,宫缩转弱25-30"/5-6',2小时查宫口仍开大6cm,宫颈边软,无水肿,胎胞突,儿头S+0.5.首先应做何项处理
A. 缩宫素静脉点滴
B. 人工破膜
C. 杜冷丁注射
D. 剖宫产术
E. 鼓励产妇进食休息

参考答案: B

11. 28岁初产妇临产16小时,肛查宫口开全2小时,先露头达棘下2+cm,骨产道正常,枕后位,胎心122次/分,此时最恰当的分娩方式是
A. 即刻剖宫产术
B. 行会阴侧切术,产钳助产
C. 静脉点滴催产素
D. 等待胎头自然旋转后阴道助产
E. 静脉高营养等待阴道分娩

参考答案: B

12. G1PO孕38周,基层转诊,腹部检查:子宫横椭圆形,儿头位于右侧腹,胎心于右脐旁可闻及,136次/分,子宫下段拉长压痛明显,宫缩时脐下可见环形凹陷,肛诊宫口开大8cm,先露S-0.5,此时应采取最适宜的方法是
A. 外倒转术
B. 内倒转术
C. 断头术
D. 碎胎术
E. 剖宫产术

参考答案: E

13. 24岁,妊娠38周头位临产14小时,破水2小时,羊水清亮,胎心140次/分,胎儿估计3000克,宫缩30"/5-6',阴道检查:宫口开大8cm,无水肿,儿头达S+1,大囟门位于4°处,儿头颅骨无重叠,1小时后宫口开大无进展,此时应采取何种措施处理
A. 缩宫素静脉点滴加速产程
B. 等待自然分娩
C. 即行剖宫产术
D. 胎头吸引器助产
E. 待宫口开全后产钳助产

参考答案: A

- G1PO孕37周,骨盆外测量:骶耻外径18.5cm,髂前上嵴间径23cm,坐骨结节间径7.5cm,坐骨结节间径+出口后矢状径之和为14cm,肛诊:骶骨板弯曲好,骨盆内聚,坐骨棘间径约9cm,骶坐切迹可容1+指,胎儿估计3000克,儿头浮,胎心140次/分,

14. 据以上骨盆所测各径线,属哪个平面狭窄
A. 骨盆入口平面狭窄
B. 骨盆出口平面狭窄
C. 中骨盆狭窄
D. 中骨盆及出口平面
E. 骨盆三个平面

参考答案: D

15. 孕39周,在家规律宫缩5小时急诊入院,肛查宫口开大4cm,产妇阵阵屏气向下用力,此时最可能的胎方位是

- A. 枕前位
B. 枕后位
C. 前不均倾位
D. 儿头高直位
E. 枕横位

参考答案: B

16. 入院后行内诊检查:宫口开5cm,宫颈周边轻度水肿,人工破膜,羊水II°。粪染,胎心120次/分,此时最适宜的处理是

- A. 即行胎儿电子监护及头皮血 pH 测定
- B. 人工破膜+催产素静脉点滴加速产程
- C. 即刻剖宫产术
- D. 肌注杜冷丁 100mg
- E. 拟行第二产程助产

参考答案: C

初产妇，孕足月规律宫缩 16 小时，肛查宫口开大 6cm，宫缩转弱，25-30/-5-6'，2 小时后，肛查宫口仍开大 6cm，S-0.5。

17. 属于下列哪种异常产程曲线：

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 胎头下降延缓
- E. 第二产程停滞

参考答案: C

18. 此种异常曲线，应考虑有哪种可能情况：

- A. 骨盆入口狭窄
- B. 漏斗骨盆
- C. 中骨盆平面狭窄
- D. 宫颈水肿
- E. 宫颈肌瘤

参考答案: C

19. 首选处理措施是

- A. 缩宫素静脉点滴
- B. 呕替啶肌注
- C. 立即剖宫产术
- D. 阴道检查
- E. 鼓励产妇进食休息

参考答案: D

20. (假设信息) 如果胎儿电子监测 CST 示“重度变异减速”，羊水 II 度污染，适宜的处理是

- A. 产钳术，尽快娩出胎儿
- B. 会阴侧切，尽快娩出胎儿
- C. 剖宫产术，尽快娩出胎儿
- D. 静脉点滴缩宫素
- E. 吸 O₂，等待自然分娩

参考答案: C

髂棘间径 髂嵴间径 骶耻外径 坐骨结节间径 耻骨弓角度

- | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|
| A. 22cm | 24cm | 17.5cm | 7.5cm | 90° |
| B. 24cm | 27cm | 18.5cm | 8.5cm | 90° |
| C. 24cm | 27cm | 16.5cm | 9.0cm | 90° |
| D. 26cm | 26cm | 16.5cm | 10.0cm | 100° |
| E. 24cm | 27cm | 18.5cm | 7.5cm | 80° |

22. 属正常女性骨盆的是

23. 属佝偻病性扁平骨盆的是

24. 属单纯性扁平骨盆的是

25. 属均小骨盆的是

26. 属漏斗型骨盆的是

参考答案: 22:B 23:D 24:C 25:A 26:E

A. 收缩强度低，具有协调性

B. 收缩力强，具有协调性

C. 收缩过强且持续，无节律性放松

D. 收缩极性倒置，间歇期子宫肌肉不能完全放松

E. 子宫上下段交界处子宫环形肌不协调性过强收缩

以上异常的子宫收缩可导致

27. 子宫收缩乏力

28. 高张型子宫收缩乏力

29. 子宫强直性收缩

30. 子宫痉挛性狭窄环

参考答案: 27:A 28:D 29:C 30:E

A. 潜伏期延长

B. 活跃期延长

C. 活跃期停滞

D. 第二产程延长

E. 滞产

下列病例最可能的诊断是

31. 孕 39 周于 8:00 临产，12:00 检查宫口开 4cm，头先露 S-2，20:00 宫口

开 8cm，先露 S+1

32. 35 岁孕 40 周，于 0:00 临产，10:00 破水，宫口开 3cm，16:00 宫口

开全，18:30 低位产钳助娩一男婴。

参考答案：31:B 32:D

- A. 会阴侧切术
- B. 产钳术
- C. 剖宫产术
- D. 等待自然分娩
- E. 催产素静脉点滴

下列病例宜采取的最恰当处理是

- 33. 初产妇孕 40 周，宫口开全 1 小时，儿头 S+3，羊水 II 度黄染
- 34. 初产妇孕 41 周，胎儿估计 3200g，骨盆测量：坐骨结节间径=7cm，耻骨弓角度<90°。

参考答案：33:B 34:C

35. (假设信息)：如剖宫产证实诊断，胎儿娩出后子宫体前壁表面呈紫蓝色，收缩不良，此时的处理是

- A. 输新鲜血
- B. 注射纤维蛋白原
- C. 注射宫缩剂并按摩子宫体，无效则切除子宫
- D. 立即切除子宫
- E. 宫腔填塞纱条

参考答案：C

36. 下列何种情况可出现病理缩复环

- A. 羊水过多
- B. 双胎
- C. 巨大儿
- D. 胎盘早期剥离
- E. 梗阻性难产

参考答案：E

37. 23 岁孕 38 周，估计胎儿 4100 克，临产 16 小时，宫口开 1cm，静脉点滴缩宫素，4 小时宫口开 9cm，产妇烦躁不安，疼痛难忍，见脐下 1 指处呈环状凹陷，有压疼，胎心 132 次/分，此时最适宜的处理是

- A. 停静脉点滴待宫口开全后阴道助产
- B. 即行产钳助产术
- C. 即行胎头吸引术
- D. 停静脉点滴即刻剖宫产术
- E. 即肌注杜冷丁

参考答案：D

G1PO 孕 41 周，临产 18 小时，因宫颈扩张活跃期停滞，宫口开大 8cm，5 小时经缩宫素静脉点滴产程无进展基层转诊，初步诊断为“子宫破裂”

38. 体检中发现最可靠的诊断依据是

- A. 产妇疼痛难忍，呼叫，烦躁不安
- B. 可见阴道多量鲜血流出
- C. 脐下病理缩复环随宫缩上升
- D. 子宫轮廓不清，胎体可清楚扪及
- E. 胎心胎动消失

参考答案：D

39. 此时患者最适宜的治疗方法是

- A. 即行阴道内诊，以明确破口部位及大小
- B. 迅速阴道助产娩出死胎
- C. 即刻剖宫取胎，同时行子宫次全切除术
- D. 剖宫取胎后，对破口小，时间短，无感染者可行修补术
- E. 输血输液观察

参考答案：D

初产妇，因第二产程延长，胎吸分娩，胎儿体重 4000g，胎儿娩出后阴道持续出血，有凝血块。

40. 此时阴道出血原因最可能的是

- A. 产后宫缩乏力
- B. 软产道裂伤
- C. 胎盘剥离不全
- D. 凝血功能障碍
- E. 子宫破裂

参考答案：B

41. 最适宜的处理是：

- A. 注射麦角新碱
- B. 注射缩宫素
- C. 配血，输血
- D. 开放静脉，手取胎盘，检查软产道
- E. 仔细检查，宫颈，阴道，有裂伤立即缝合

参考答案：D

42. 产后 1 小时，再次出血，BP 70 / 30mmHg，面色苍白，出冷汗，此时出血原因是：

- A. 胎盘剥离不全

- B 胎盘残留
- C 子宫收缩乏力
- D 凝血功能障碍
- E 软产道裂伤

参考答案: C

43. 为预防产后出血，下列哪项不宜
- A 对具有产后出血高危因素产妇，做好准备工作
 - B 第一产程密切观察，避免产妇过度疲劳
 - C 重视第二产程处理，指导产妇适时正确使用腹压
 - D 第三产程准确收集出血量，并检查胎盘，胎膜是否完整
 - E 胎盘娩出后，产妇继续留在产房观察1小时

参考答案: E

44. 产后出血是指胎儿娩出后24小时内出血量超过
- A. 200毫升
 - B. 300毫升
 - C. 400毫升
 - D. 500毫升
 - E. 600毫升

参考答案: D

45. 产后宫缩乏力性出血时的临床表现正确的是
- A. 胎儿娩出后即见血液不断流出
 - B. 血色暗红无凝块
 - C. 宫缩时出血量增多
 - D. 胎盘未剥离前即出血不止，多伴有第三产程延长
 - E. 宫体软，轮廓不清

参考答案: E

46. 关于软产道裂伤，正确的是
- A. 会阴Ⅱ度裂伤包括肛门外括约肌损伤
 - B. 宫颈轻微裂伤即会引起较多量出血
 - C. 宫颈裂伤多发生于宫颈6点及12点处
 - D. 宫颈裂伤时应从裂伤的外侧端开始间断缝合
 - E. 会阴Ⅰ度裂伤仅为会阴皮肤及阴道口粘膜撕裂

参考答案: E

47. 26岁G1P0孕41周，因臀位行臀牵引术，胎儿娩出后5分钟突发阴道多量出血约400ml，检查血压100/60mmHg，脉搏100次/分，宫底脐平，此时最适宜的处理是
- A. 静脉点滴缩宫素
 - B. 检查软产道有无损伤
 - C. 行人工剥离胎盘
 - D. 按摩子宫
 - E. 纱布填塞宫腔

参考答案: C

48. 26岁G1P0孕29周，胎动胎心消失一周入院，经人工破膜及缩宫素点滴娩出一死婴，即开始不断的阴道出血，经人工剥离胎盘及使用宫缩剂后仍无效果，出血不止，无凝血块此例产后出血的原因可能是

- A. 产后宫缩乏力
- B. 软产道损伤
- C. 子宫破裂
- D. 子宫腔内感染
- E. 凝血功能障碍

参考答案: E

24岁农村妇女，平素健康，孕足月在家由乡医接生，胎儿娩出后，即流出大量鲜血，新生儿体重4,200克，15分钟后胎盘自然娩出，但一直阴道持续流血，有血块，转上级医院时，面色苍白，四肢凉，BP60/40mmHg，P130次/分，弱，经输血1200毫升后，血压回升至90/60mmHg，给予积极恰当治疗后，病情稳定，出血停止，次日查血常规，Hb7.5g/dl，又输同型血800毫升。

49. 此患者最可能的诊断是：

- A. 凝血功能障碍
- B. 子宫收缩乏力
- C. 胎盘滞留
- D. 软产道裂伤
- E. 前置胎盘

参考答案: D

50. 这位患者最可能的晚期并发症是

- A. 闭经溢乳综合征
- B. 施-李综合征
- C. 席汉（希恩）综合征
- D. 西蒙综合征
- E. 库兴综合征

参考答案: C

51. 并发症最早可出现

- A. 产后6小时
- B. 产后1周
- C. 产后1个月
- D. 产后6个月
- E. 产后1年

参考答案：B

52. 诊断胎儿宫内窘迫，哪项是错误的
A. 胎心音不规律，<100 次/分为宫内缺氧严重
B. 胎动频繁
C. 羊膜镜检查羊水深绿色
D. 胎儿头皮血 pH 值<7.20
E. 胎儿电子监测示早期减速

参考答案：E

53. 26岁，G1P0 孕41周，宫口开大4-5cm时，胎心听诊120次/分，胎心监测示：“晚期减速”，胎儿头皮血 pH 值 7.16，最恰当的处理为

- A. 面罩吸氧提高胎儿血氧供能
B. 产妇左侧卧位，观察产程，等待自然分娩
C. 静推葡萄糖+维生素 C+可拉明，加强胎儿对缺氧的耐受力
D. 立即剖宫产
E. 待宫口开全，阴道助产缩短第二产程

参考答案：D

54. 24岁，初产妇临产，产程进展顺利，宫口开全半小时，儿头已拨露，LOA，胎儿电子监测示“晚期减速”，此时应采取哪项处理

- A. 立即行剖宫产术结束分娩
B. 产钳助产
C. 静脉点滴催产素加速分娩
D. 继续观察胎心图像变化
E. 等待阴道自然分娩

参考答案：B

55. 24岁，G1P0 孕40周，头位临产8小时，宫口开大5cm，突然胎心不规律，108-132次/分，自然破水，羊水Ⅱ度粪染，胎心监测图像为变异减速，此时最可能的原因是

- A. 宫缩过强致胎盘血流量减少
B. 子宫血管内红细胞携氧不足
C. 胎盘功能减退
D. 脐带受压
E. 胎头受压

参考答案：D

56. 抢救新生儿窒息的首要措施是

- A. 清理呼吸道
B. 人工呼吸
C. 给呼吸中枢兴奋剂
D. 加压给氧
E. 给予碳酸氢钠纠正酸中毒

参考答案：A

57. G1P1 孕40周，因羊水Ⅲ度粪染产钳分娩，新生儿出生1分钟时心率90次/分，呼吸20次/分，不规则，四肢屈肌张力略大吸痰咽有反射，躯干红润，四肢发紫，正确的 Apgar 评分是

- A. 4分
B. 5分
C. 6分
D. 7分
E. 8分

参考答案：C

58. 新生儿 Apgar 评分的五项依据是

- A. 心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色
B. 心率、呼吸、脐血管充盈度、羊水性状、皮肤颜色
C. 心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射
D. 心率、呼吸、喉反射、哭声、脐血管充盈度
E. 心率、呼吸、喉反射、皮肤颜色、哭声

参考答案：C

59. 32岁，G1P0 宫内孕41周，LOA，临产3小时，宫缩50秒/3-5分，宫口开大5cm，破膜时羊水Ⅲ度粪染，胎心110次/分，该产妇首先采取的处理是

- A. 迅速结束分娩
B. 杜冷丁 100mg 肌注
C. 氧气吸入并考虑剖宫产
D. 尼可刹米肌注
E. 侧卧位

参考答案：C

第十三单元 异常产褥

1. 产褥感染最常见的原因是
A. 急性子宫内膜炎
B. 急性盆腔结缔组织炎
C. 急性输卵管炎
D. 腹膜炎
E. 栓塞性静脉炎

参考答案：A

2. 产褥感染处理原则，错误的是
A. 选用有效的抗生素

- B. 纠正全身一般情况
- C. 半卧位以利引流
- D. 禁用肾上腺皮质激素，避免感染扩散
- E. 胎盘残留者，应控制感染后清宫

参考答案：D

3. 足月产后三天，出现下腹疼，体温不高，恶露多，有臭味子宫底脐上一指，子宫体软，本例为

- A. 子宫内膜炎
- B. 子宫肌炎
- C. 盆腔结缔组织炎
- D. 急性输卵管炎
- E. 腹膜炎

参考答案：A

4. 25岁，G1P0足月妊娠，胎膜早破，自然分娩后第三天，体温38.8°C，下腹疼，恶露血性混浊有臭味，宫底平脐，压痛，白血球15.8×10^9/L，中性粒细胞80%，最可能的诊断是

- A. 急性子宫颈炎
- B. 急性子宫内膜炎及子宫肌炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 败血症

参考答案：B

B型题

- A. 子宫内膜炎、子宫肌炎
- B. 产后下肢血栓性静脉炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 产后子宫滋养细胞肿瘤

5. 产后2-3周寒战，下肢肿胀、疼痛，皮肤紧张发白
6. 产后3-4天，体温38°C，子宫体轻压痛，恶露量多且臭

7. 产后3天突然畏寒，高热达40°C，恶心，呕吐，下腹剧痛且有压痛，反跳痛，腹肌紧张

感

参考答案：5:B 6:A 7:D

第十五单元 外阴上皮非瘤样病变

2. 关于外阴硬化性苔藓正确的说法是
- A. 属外阴上皮内非瘤样病变
 - B. 合并有不典型增生
 - C. 只发生在40岁以上妇女
 - D. 外阴皮肤因过度角化颜色发黑
 - E. 临床表现不能做初步诊断

参考答案：A

6. 病理报告为CINⅢ级提示
- A. 外阴轻度不典型增生
 - B. 外阴中度不典型增生
 - C. 外阴重度不典型增生
 - D. 原位癌
 - E. 重度不典型增生和原位癌

参考答案：E

9. 外阴鳞状上皮增生的癌变率为

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 0%
- E. 2%-3%

参考答案：C

十四单元 女性生殖系统炎症

1. 关于滴虫性阴道炎临床表现，正确的是
- A. 外阴瘙痒，红肿灼痛
 - B. 悬滴法找到白细胞增多
 - C. 阴道pH值4.5
 - D. 阴道粘膜上附着白膜，擦拭后露出红肿粘膜面
 - E. 稀薄泡沫状白带增多

参考答案：E

2. 关于滴虫性阴道炎的治疗，下列何项是错误的
- A. 顽固者夫妻应同时口服甲硝唑治疗
 - B. 妊娠早期不宜服用甲硝唑治疗
 - C. 甲硝唑不能通过胎盘进入胎儿体内
 - D. 局部用药效果最佳
 - E. 阴道放药前先用酸性溶液冲洗可提高疗效

参考答案：C

3. 绝经期妇女已除外恶性肿瘤，出现血性白带最可能的是
- A. 宫颈息肉
 - B. 宫颈糜烂

- C. 宫腔积液 D. 老年性阴道炎

E. 更年期月经紊乱

参考答案: D

4. 有关真菌性阴道炎,以下哪项是错误的
A. 多见于孕妇、糖尿病患者,接受雌激素治疗或长期使用抗生素者
B. 白色念珠菌寄居于口腔、肠道及阴道黏膜,三部位可互相感染
C. 局部用酸性液冲洗后用制霉菌素达克宁栓剂
D. 可感染新生儿
E. 可口服斯皮仁诺

参考答案: C

5. 宫颈鳞状上皮化生,下列哪项是错误的
A. 鳞状上皮化生是宫颈糜烂愈合的过程
B. 鳞状上皮不仅代替了糜烂的柱状上皮,而且代替了腺上皮
C. 化生的鳞状上皮在排列、形态上有异常时,应诊断为不典型增生
D. 化生的鳞状上皮来自柱状上皮下的基底细胞(储备细胞)
E. 化生后的鳞状上皮具有可逆性,再成为糜烂面

参考答案: C

6. 取子宫内膜作病理检查以诊断生殖器结核,关于注意事项,
A. 应于经前1周或月经来潮12h内作诊刮
B. 术前3天,术后4天,每天肌注链霉素、青霉素1次
C. 应注意刮取子宫角部内膜
D. 病理切片找到典型结核结节,诊断即可成立
E. 子宫腔小而坚硬,无组织刮出,可以排除内膜结核

参考答案: E

7. 40岁,近3日白带增多,伴外阴搔痒就诊,检查外阴粘膜充血,阴中等量,呈稀薄泡沫状,宫颈充血此病人应进行的辅助检查是
A. 血常规
B. 尿常规
C. 阴道分泌物细菌培养及药敏试验
D. 悬滴法阴道分泌物查滴虫
E. 阴道细胞学检查

参考答案: D

8. 此病人确切的诊断是
A. 霉菌性阴道炎 B. 滴虫性阴道炎
C. 老年性阴道炎 D. 阿米巴阴道炎
E. 外阴搔痒症

参考答案: B

9. 对此病人的治疗,哪项是不妥的
A. 0.5%醋酸冲洗阴道,口服增效联磺片0.5克,每日两次共五天
B. 甲硝唑200mg,口服,每日三次,共七天
C. 替硝唑2克,单次口服,爱人同时服2克
D. 甲硝唑200mg,每晚塞入阴道内,共10天
E. 甲硝唑2克,单次口服

参考答案: A

10. 关于宫颈糜烂,正确的是
A. 因宫颈组织呈现糜烂面病变而得名
B. 按糜烂程度分为单纯型和乳突型
C. 按糜烂面积分为三度
D. 宫颈糜烂面为鳞状上皮所覆盖
E. 宫颈糜烂与早期宫颈癌从外观上极易鉴别

参考答案: C

11. 关于慢性宫颈炎,不正确的是
A. 宫颈肥大系由慢性炎症长期刺激所致
B. 治疗宫颈糜烂前,应先行宫颈刮片,除外早期宫颈癌
C. 宫颈息肉摘除后常可复发
D. 糜烂面的柱状上皮被鳞状上皮取代,即为宫颈糜烂愈合
E. 宫颈肥大是由于鳞状上皮化生引起

参考答案: E

12. 宫颈重度糜烂患者,行宫颈刮片为巴氏Ⅲ级,下一步处理应是
A. 三个月后复查宫颈刮片
B. 激光治疗
C. 宫颈锥形切除
D. 取宫颈活体组织送检
E. 属正常改变,无须处理

参考答案: D

13. 28岁,患慢性盆腔炎2年,反复发作,此次入院因高热3天,宫正常大小,左侧可及5×6×7cm包块,张力大,不活动,压痛明显,最
A. 中药治疗

- B. 中药及抗生素治疗
- C. 给予足够抗生素下行后穹窿穿刺抽脓
- D. 抗生素及物理治疗
- E. 后穹窿切开引流术

参考答案: C

14. 28岁, 婚后5年未孕, 半年来低热, 食欲不振, 伴乏力, 检查: 子宫略小, 活动受限, 双侧附件结节样增厚, 最可能的诊断是

- A. 子宫内膜异位症
- B. 慢性盆腔炎
- C. 生殖器结核
- D. 子宫发育不良
- E. 多囊卵巢综合征

参考答案: C

15. 34岁, 已婚女性, 白带增多, 腥臭1个月, 外阴不痒。最可能的诊断是

- A. 真菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 细菌性阴道病
- D. 外阴炎
- E. 以上都不是

参考答案: C

16. 29岁, 已婚女性, 脓性白带1周, 检查外阴(-), 阴道(-), 子宫颈充血、触血(+), 宫颈口有脓性分泌物, 宫腔(-)。最可能的诊断是

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 真菌性阴道炎
- C. 细菌性阴道炎
- D. 子宫颈沙眼衣原体感染
- E. 子宫颈厌氧菌感染

参考答案: D

17. 女性患者, 外阴瘙痒、灼痛2天, 坐卧不宁, 痛苦非常, 来院就诊, 妇科检查见白带较多, 呈白色稠厚豆渣样, 小阴唇内侧附着有白色膜状物, 擦除后露出红肿黏膜面, 则其最可能的诊断为

- A. 滴虫阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 细菌性阴道炎
- D. 淋病
- E. 生殖器疱疹

参考答案: B

18. 34岁, 患慢性宫颈炎有重度糜烂, 需作电熨或激光治疗, 下列注意事项。哪项是错误的

- A. 月经净后15天可作电熨或激光治疗
- B. 急性生殖器炎症时不能作电熨或激光治疗
- C. 术后应避免盆浴及性生活1个月
- D. 术后阴道流出大量黄水
- E. 术后2周结痂脱落, 阴道分泌物减少

参考答案: A

B型题

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 霉菌性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 幼女性阴道炎
- E. 淋球菌性阴道炎

19. 妊娠, 糖尿病患者及接受大量雌激素治疗者易于发生

20. 白带呈脓性泡沫状, 用酸性液体冲洗阴道可提高疗效

参考答案: 19. B 20. A

- A. 卵巢囊肿蒂扭转
- B. 急性盆腔炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 宫外孕
- E. 卵巢巧克力囊肿

21. 高热, 腹痛, 触诊宫旁两侧呈片状增厚

22. 经期腹痛, 子宫一侧或双侧可及肿物, 活动受限

参考答案: 21: B 22: E

- A. 输卵管伞端闭锁, 管腔内浆液积聚, 状如腊肠
- B. 输卵管伞端与卵巢粘连贯通, 液体渗出
- C. 盆腔结缔组织炎, 纤维组织增生变硬, 直达盆壁
- D. 炎症经子宫内膜侵犯肌层
- E. 盆腔结缔组织炎, 浆液破入直肠或阴道

23. 输卵管积水

24. 输卵管卵巢囊肿

25. "冰冻骨盆"

参考答案: 23: A 24: B 25: C

- A. 仰卧位
- B. 半卧位
- C. 膀胱截石位
- D. 膝胸卧位
- E. 垂头仰卧位

26. 急性盆腔腹膜炎应采取

27. 刮宫术应采取

参考答案: 26: B 27: C

第十五单元 外阴上皮非瘤样病变

1. 关于外阴硬化性苔藓正确的说法是

- A 属外阴上皮内非瘤样病变
- B 合并有不典型增生
- C 只发生在 40 岁以上妇女
- D 外阴皮肤因过度角化颜色发黑
- E 临床表现不能做初步诊断

参考答案: A

2. 病理报告为 CIN III 级提示

- A 外阴轻度不典型增生
- B 外阴中度不典型增生
- C 外阴重度不典型增生
- D 原位癌
- E 重度不典型增生和原位癌

参考答案: E

3. 外阴鳞状上皮增生的治疗药物首选

- A 红霉素软膏
- B 鱼肝油软膏
- C 皮质激素类软膏
- D 维生素 B6 软膏
- E 口服 B 族维生素

参考答案: C

4. 外阴硬化性苔藓治疗的标准方案是

- A 2% 丙酸睾丸酮凡士林软膏局部涂抹
- B 皮质激素类软膏局部涂抹
- C 红外线理疗
- D 每日坐浴 2 次
- E 红霉素软膏局部涂抹

参考答案: A

十六单元 女性生殖器官肿瘤

1. 19 岁少女, 自觉腹部包块半年, 未见迅速增大, 月经正常。下腹偏右可触及囊性包块, 如儿头大小, 活动佳, 腹部 X 光平片见右下腹数块大小不等的钙化影, 应诊断为

- A. 结核性盆腔炎性包块
- B. 卵巢皮样囊肿
- C. 子宫肌瘤
- D. 卵巢癌
- E. 卵巢巧克力囊肿

参考答案: B

2. 24 岁, 已婚, 停经 2 个半月, 阴道少量出血。妇科检查: 子宫增大如妊娠 4 个月大小, 软, 于子宫右侧触及一约 7cm 直径大小的囊性包块, 表面光滑, 活动, 无压痛。右侧囊性包块最可能的诊断是

- A. 卵巢黄体囊肿
- B. 卵巢黄素囊肿
- C. 输卵管结核性包块
- D. 卵巢巧克力囊肿
- E. 单纯性卵巢囊肿

参考答案: B

3. 59 岁, 绝经 8 年, 近 3 个月阴道出血 2 次, 每次持续 3 天, 妇科检查: 外阴, 阴道无萎缩, 宫颈光滑, 子宫前位, 正常大小, 右侧附件区可触及手拳大肿物, 质地中等, 光滑, 实性, 活动良好, 无腹水, 全身淋巴结无转移

3. 为确诊需行哪项检查

- A. 分段诊断性刮宫
- B. 宫腔分泌物涂片找癌细胞
- C. 宫颈防癌刮片
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈活体组织检查

参考答案: A

4. 本病人最可能的诊断为

- A. 子宫内膜癌

- B. 卵巢颗粒细胞瘤
- C. 卵巢无性细胞瘤
- D. 卵巢畸胎瘤
- E. 卵巢睾丸母细胞瘤

参考答案：B

5. 最恰当的治疗为

- A. 化疗加放疗
- B. 放疗为主
- C. 右侧附件切除术
- D. 全子宫加双侧附件切除术
- E. 肿瘤细胞减灭术

参考答案：E

6. 辅助治疗应加用

- A. 化疗
- B. 放疗
- C. 雌激素治疗
- D. 雄激素治疗
- E. 孕激素治疗

参考答案：A

女，56岁，腹胀3月，1月加重，查体：消瘦病容，半卧位，腹部高度膨隆，张力大，妇检，阴道通畅，宫颈光滑，萎缩，子宫小，触诊不满意，经阴道后穹窿触及子宫直肠凹陷处腹膜片状增厚伴多处砂粒样结节，似可触到肿物，边界不清楚。肝功能检查正常，肾功能检查正常，血压、脉搏、体温均正常。

7. 应首先考虑的诊断是：

- A. 结核性腹膜炎
- B. 肝硬化腹水
- C. 肾病综合症
- D. 巨大卵巢囊肿
- E. 卵巢恶性肿瘤

参考答案：E

8. 进一步应作哪项检查：

- A. 抽腹水常规化验 + 培养
- B. 抽腹水病理检查找肿瘤细胞
- C. 盆腹腔B超
- D. 腹腔镜检查
- E. 盆腹腔CT检查

参考答案：C

9. 假设腹水中找到恶性肿瘤细胞，下一步首先应进行

- A. 放出部份腹水，减轻病人痛苦，并再次内诊检查，查清肿物。
- B. 放腹水同时注入化疗药物
- C. 放腹水同时注入抗生素
- D. 直接开腹手术
- E. 腹腔镜下放部分腹水并能查清肿瘤性质(活检)

参考答案：B

10. 假设此病人除腹水中找到肿瘤细胞外，伴有胸水并找到同样类型的肿瘤细胞，临床肿瘤分期应为

- A. III期
- B. IIIc期
- C. IV期
- D. IIC期
- E. IC期

参考答案：C

11. 此病人应考虑何种治疗方案：

- A. 化疗后手术
- B. 放弃手术，进行放疗或化疗
- C. 开腹探查术，已广泛转移即关腹，以后化疗后放疗
- D. 卵巢肿瘤细胞减灭术 + 化疗
- E. 姑息性治疗

参考答案：D

12. 下列哪种疾病是引起月经过多的原因

- A. 浆膜下子宫肌瘤
- B. 粘膜下子宫肌瘤
- C. Asherman综合征
- D. 卵巢畸胎瘤
- E. 输卵管妊娠

参考答案：B

13. 56岁，绝经4年，水样白带半年，阴道少量不规则出血6天。检查：宫颈光，宫体正常大小，附件未触及肿物，诊断刮宫，宫颈未刮出组织，宫腔8cm，刮出较厚白色具脆性的内膜，病理为宫体腺癌，应如何处

- A. 子宫广泛性切除，盆腔淋巴结清除术

- B. 子宫次广泛切除术
- C. 子宫全切术
- D. 放射治疗
- E. 孕酮治疗

参考答案: B

14. 关于子宫肌瘤的手术治疗, 下述哪项是不正确的
- A. 近绝经期, 子宫如孕3个月大小, 症状轻者, 可暂不手术
 - B. 肌瘤小, 症状明显, 经保守治疗无效者应考虑手术
 - C. 突出于阴道内的粘膜下肌瘤应行手术治疗
 - D. 年轻, 未生育过的妇女壁间肌瘤不论多发或单发, 均应行肌瘤剔除术
 - E. 疑有恶变者不宜行剔除术

参考答案: D

15. 不引起阴道不规则出血及异常排液的生殖器肿瘤是
- A. 子宫内膜癌
 - B. 子宫颈管癌
 - C. 原发性输卵管癌
 - D. 子宫黏膜下肌瘤
 - E. 卵巢浆液性囊腺癌

参考答案: E

16. 晚期及复发的子宫内膜癌患者, 为暂时控制病情进展, 可选用
- A. 化疗
 - B. 放疗
 - C. 高效孕激素类药物
 - D. 孕酮
 - E. 手术治疗

参考答案: C

17. 能合成甲胎蛋白的卵巢肿瘤是
- A. 纤维瘤
 - B. 内胚窦瘤
 - C. 成熟畸胎瘤
 - D. 库肯勃瘤
 - E. 颗粒细胞瘤

参考答案: B

18. 54岁, 绝经2年, 阴道流血1个月, 外阴, 阴道萎缩不明显, 宫颈光滑, 子宫正常大小, 右侧触及 $8\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4\text{cm}$ 大小韧性椭圆形包块, 稍活动, 左附件正常, 阴道细胞涂片提示雌激素水平高度影响, 分段诊断性刮宫, 子宫内膜活检病理切片为子宫内膜腺囊性增生, 颈管内膜未见异常, 此病首先应考虑为

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 卵巢皮样囊肿
- C. 卵巢子宫内膜异位囊肿
- D. 卵巢颗粒细胞瘤
- E. 子宫内膜癌

参考答案: D

19. 抗癌药物(化疗)对下列哪种女性生殖器恶性肿瘤疗效最好
- A. 卵巢癌
 - B. 子宫体癌
 - C. 子宫颈癌
 - D. 子宫肉瘤
 - E. 绒毛膜癌

参考答案: E

20. 32岁, 已婚, 未育, 半年前妇科检查子宫右侧有一直径 10cm 囊性肿块, 活动, 诊断为卵巢皮样囊肿。现停经8周, 恶心、食欲减退, 宫颈着色, 子宫2个月妊娠大小, 软、前倾, 右侧可触及 10cm 直径大小囊肿, 活动, 无压痛, 左侧阴性, 诊断为早期妊娠合并卵巢皮样囊肿, 正确处理的方法是

- A. 人工流产
- B. 立即剖腹囊肿切除并剖除对侧卵巢
- C. 人工流产后切除附件囊肿
- D. 妊娠3个月后剖腹, 行囊肿切除术及对侧卵巢详细检查
- E. 足月妊娠剖宫产及囊肿摘除术

参考答案: D

21. 当由于卵巢肿瘤而发生蒂扭转的时候, 其扭转的蒂的组成是
- A. 子宫圆韧带、输卵管
 - B. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢韧带
 - C. 骨盆漏斗韧带、输卵管和卵巢固有韧带
 - D. 骨盆漏斗韧带、输卵管和子宫圆韧带
 - E. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢固有韧带

参考答案: C

22. 20岁未婚少女，3个月前发现腹部肿块，伴胸、腹水，均为淡黄色滤出液，患者月经正常，一般情况好，妇科检查：子宫后位，大小正常，其右前方实质性肿块 $15\text{cm} \times 12\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，表面光滑，浮球感，下列哪项为最可能的诊断

- A. 卵巢颗粒细胞瘤
- B. 卵巢无性细胞瘤
- C. 卵巢纤维瘤
- D. 卵巢恶性畸胎瘤
- E. 盆腔结核

参考答案：C

23. 24岁，孕3个月，下床后突然出现右下腹持续性剧烈疼痛。妇科检查：子宫如妊娠3个月大小，质软，右侧附件区肿物如新生儿头大小，近右侧宫角区压痛明显拒按，最可能的诊断是

- A. 卵巢囊肿破裂
- B. 卵巢囊肿感染
- C. 阑尾周围脓肿
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 先兆流产

参考答案：D

24. 33岁，诊断为左附件肿物行开腹术，术中见少量血性腹水，子宫正常大小，左卵巢肿物 $6\text{cm} \times 7\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，实性，表面有乳头生长，质脆，与大网膜及肠管有粘连，应行的术式是

- A. 肿物切除术
- B. 双侧附件切除术
- C. 全子宫切除术及双附件切除术
- D. 左附件切除术
- E. 全子宫及双附件切除术，同时行大网膜切除术及盆腔淋巴结清除术

参考答案：E

25. 50岁，月经不规律2年，3~4天/2~3个月，妇科普查发现右侧卵巢肿物 $6\text{cm} \times 5\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，质硬，活动差，最恰当的处理是

- A. 短期内严密观察
- B. 定期随访，等待绝经后肿物自行消失
- C. 收入院择期手术治疗
- D. 化疗
- E. 腹腔镜检查进一步确诊

参考答案：C

B型题

- A. 卵巢浆液性囊腺瘤
- B. 卵巢囊性畸胎瘤
- C. 颗粒细胞瘤
- D. 卵巢纤维瘤
- E. 卵巢黄素囊肿

26. 发生于体腔上皮者

27. 发生于生殖细胞者

参考答案：26: A 27: B

- A. 雌激素升高
- B. α -FP升高
- C. 17酮17羟类固醇升高
- D. hCG升高
- E. 血清CA125明显升高

28. 卵巢绒毛膜上皮癌

29. 卵巢卵泡膜细胞瘤

30. 卵巢睾丸母细胞瘤

31. 卵巢浆液性囊腺癌

32. 卵巢内胚窦瘤

参考答案：28: D 29: A 30: C 31: E 32: B

- A. 发生于体腔上皮
- B. 发生于生殖上皮
- C. 发生于性索间质并具内分泌功能
- D. 发生于卵巢间质增生和卵泡膜细胞增生
- E. 转移而来

33. 卵巢无性细胞瘤

34. 卵泡膜细胞瘤

35. 库肯勃氏瘤

36. 透明细胞瘤

参考答案：33: B 34: C 35: E 36: A

第十七单元 滋养细胞疾病

1. 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌均可发生于

- A. 自然流产后
- B. 人工流产后

- C. 输卵管妊娠后
- D. 葡萄胎排空后
- E. 足月分娩后

参考答案: D

- 2. 关于滋养细胞疾病的发生正确的是
- A. 侵蚀性葡萄胎有部分是继发于流产后
- B. 绒毛膜癌可继发于足月分娩或死胎
- C. 绝经后妇女不会再患绒毛膜癌
- D. 葡萄胎的发生仅与精子的异常有关
- E. 侵蚀性葡萄胎的发生机会为 20-40%

参考答案: B

- 3. 鉴别侵蚀性葡萄胎和绒毛膜癌, 正确的是
- A. 有黄素囊肿者为侵蚀性葡萄胎
- B. 子宫标本镜下未见绒毛结构, 仅能见到成团的滋养细胞者为绒毛癌
- C. 侵蚀性葡萄胎都有肺内转移, 而绒毛膜癌无肺内转移
- D. 两者发病都可继发于足月产或流产后
- E. 葡萄胎清宫后间隔半年以上者为绒毛膜癌

参考答案: B

- 4. 侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌最常见的转移部位是
- A. 肺内转移
- B. 阴道转移
- C. 脑转移
- D. 盆腔转移
- E. 肝转移

参考答案: A

- 5. 葡萄胎排空后随访时最重要的检查项目是
- A. B超检查
- B. 阴道脱落细胞涂片检查
- C. 盆腔内诊检查
- D. X线胸片
- E. 血 hCG 检查

参考答案: E

- 6. 侵蚀性葡萄胎的诊断标准正确的是
- A. 侵入子宫肌层, 滋养细胞高度增生
- B. 子宫肌层及子宫以外转移的切片中可见到绒毛或绒毛的退变痕迹
- C. 肉眼可见多量细小水泡组织
- D. 伴有肺内及阴道转移
- E. 葡萄胎清宫 6 周以后, 血 hCG 持续不降至正常水平

参考答案: B

- 7. 葡萄胎行清宫术时, 下列哪项处理是不正确的
- A. 确诊后择期清宫
- B. 一般采用吸宫术
- C. 首先应选择大号吸管
- D. 子宫缩小后可慎重刮宫
- E. 刮出物送组织学检查

参考答案: A

8. 28岁, 人工流产术后不规则阴道出血 3 个月, 经 2 次刮宫术均未见明显妊娠残留组织, 亦未送病检, B超子宫增大如孕 2 个月, 宫底部 $3 \times 4\text{cm}$ 结节, 内部回声杂乱, 伴部分强回声, 首先应考虑的诊断是

- A. 宫外孕
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 绒毛膜癌
- D. 人工流产不全
- E. 人工流产后宫腔感染

参考答案: C

25岁已婚妇女, 尚未生育, 此次停经 2.5 月伴少量阴道出血 3 天就诊, 医生检查子宫大小明显超出停经月份

- 9. 为明确诊断, 采用哪种辅助检查最适宜?

- A. 血 β -HCG 测定
- B. 腹部 X 线平片
- C. 多普勒超声检查
- D. B型超声检查
- E. A型超声检查

参考答案: D

- 10. 如果检查为葡萄胎, 处理上哪项是错误的?

- A. 明确诊断后应, 及时清除宫内容物
- B. 如有黄素囊肿应手术切除
- C. 全面检查除外侵蚀性葡萄胎
- D. 吸宫后子宫明显缩小, 可慎重刮宫, 并送病理

E. 估计有出血可能者，应备血、输液

参考答案：B

11. 出院后应随诊，下列哪项处理是错误的？

A. 随访期至少 2 年

B. 应避孕半年

C. 随诊时注意有无转移症状

D. 定期测定血 HCG

E. 必要时胸部 X 线摄片或超声显像检查

参考答案：B

A. 绒毛膜癌脑转移

B. 绒毛膜癌肺转移

C. 葡萄胎预防性化疗

D. 部分性葡萄胎

E. 完全性葡萄胎

12. 氨甲喋呤用于

13. 更生霉素用于

14. 5-氟尿嘧啶

参考答案：12: A 13: B 14: C

A. 部分性葡萄胎

B. 完全性葡萄胎

C. 侵蚀性葡萄胎

D. 绒毛膜癌

E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

15. 绒毛水泡状改变，组织出血，坏死，侵入子宫肌层

16. 坏死灶内见滋养细胞，血块及凝固性坏死组织，未见绒毛结构

参考答案：15: C 16: D

第十八单元 生殖内分泌疾病

1. 为确定病人为子宫内膜脱落不全时，取子宫内膜行病理检查的最合适时间是

A. 月经来潮 12 小时内

B. 排卵期前后

C. 月经来潮第 5-6 天

D. 月经前期

E. 月经期任何时间

参考答案：C

2. 导致青春期无排卵型功血的原因是

A. 不能形成正常月经周期中的 FSH 和 LH 峰状分泌

B. 雌激素水平低落

C. 黄体功能不全

D. 内膜前列腺素含量过高

E. 雌、孕激素水平均低落

参考答案：A

3. 关于无排卵型功血，下列哪项是错误的

A. 多见于青春期、更年期

B. 基础体温单相

C. 雌、孕激素水平均低

D. 月经周期中不能形成 LH 峰

E. 月经期子宫内膜为增生型

参考答案：C

4. 27 岁，月经频发，经血量正常，因婚后 4 年未孕来就诊，妇科检查：子宫后倾，正常大小，双附件无异常，基础体温呈双相型，最可能的诊断是

A. 无排卵型功血

B. 排卵期出血

C. 黄体功能不全

D. 子宫内膜脱落不全

E. 子宫内膜炎

参考答案：C

5. 29 岁，停经 56 天后阴道出血 10 天。检查：子宫正常大小，质软，宫颈粘液见典型羊齿状结晶，应考虑为

A. 先兆流产

B. 卵巢性闭经

C. 异位妊娠

D. 无排卵型功血

E. 黄体萎缩不全所致的出血

参考答案：D

6. 30 岁，结婚 4 年未孕，月经稀发，测基础体温呈单相型，在月经来潮前 5 天取宫颈粘液检查，应是

A. 典型羊齿状结晶

- B. 无结晶形成
- C. 典型椭圆体
- D. 不典型椭圆体
- E. 非典型羊齿状结晶与椭圆体共存

参考答案: A

7. 38岁, 继发不育, 自然流产2次, 月经规律(4-5天/20-23天), 经量正常, 无痛经, 妇科检查无异常, 应首先做下列哪项检查

- 协助诊断
- A. 宫颈粘液检查
- B. 血LH, FSH测定
- C. B超检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 基础体温测定

参考答案: E

8. 50岁, 近一年来月经不规律, 月经量增多, 经期延长, 妇科检查无异常发现, 血红蛋白90g/L, 应做下列哪项处理

- A. 生殖激素测定
- B. B超检查
- C. 诊断性刮宫
- D. 药物调整月经周期
- E. 雄激素止血

参考答案: C

9. 39岁, G3P1, 自然流产后出现月经不规律, 8-10/26+天, 基础体温双相, 月经第5天刮宫, 内膜活检可见部分分泌期子宫内膜, 应诊断为

- A. 无排卵型月经
- B. 黄体功能不全
- C. 子宫内膜脱落不全
- D. 正常月经
- E. 不全流产

参考答案: C

10. 24岁, 结婚3年不孕, 月经周期24天, 经期正常, 经量多, 测基础体温曲线高温相为8天, 本例考虑为

- A. 无排卵型功能失调性子宫出血
- B. 黄体功能不全
- C. 子宫内膜脱落不全
- D. 属正常月经周期
- E. 排卵型月经过多

参考答案: B

11. 18岁未婚, 于停经2月后阴道出血20余天未净, 今晨突然晕倒, 家属送来, 平素月经周期为10+天/2-6月. 体检: 血压为12/8kPa, (90/60mmHg), 脉搏120次/分, 肛诊: 子宫正常大小, 略软, B超宫腔内膜线无异常, 血红蛋白50g/L, 考虑此患者出血的最大可能性是

- A. 黄体功能不全
- B. 子宫内膜脱落不全
- C. 无排卵型功血
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 不全流产

参考答案: C

12. 受精卵着床必须具备的条件, 哪项是错误的

- A. 透明带必须消失
- B. 滋养层分化出合体滋养层
- C. 受精卵发育至囊胚期
- D. 囊胚与子宫内膜同步发育
- E. 必须有足够量的雌激素

参考答案: E

13. 38岁, 结婚10年不孕, 月经一直不规律, 临床考虑为"无排卵型功血"根据月经史, 下列哪种情况符合其诊断

- A. 周期紊乱, 经期长短不一, 经血量时多时少
- B. 周期正常, 经期延长, 经血量多
- C. 周期正常, 经血量多
- D. 周期正常, 月经中期少量出血
- E. 周期缩短, 经血量稀少

参考答案: A

14. 下列何种辅助检查结果可确定诊断

- A. 基础体温呈双相型
- B. 经前宫颈粘液可见椭圆形细胞
- C. B超可见子宫内膜线增厚
- D. 经前期诊刮, 病理示: 增殖期子宫内膜"
- E. 经前期妇科会诊, 子宫增大变软

参考答案: D

15. 采取何种治疗方法可达到治疗目的

- A. 诊断性刮宫术
- B. 药物刮宫术
- C. 雌激素
- D. 氯底酚胺
- E. 大量止血药物

参考答案: D

16. 原发性闭经患者, 孕, 雌激素试验均为阴性, 其病变部位应确定在

- A. 子宫
- B. 卵巢
- C. 垂体
- D. 丘脑下部
- E. 肾上腺

参考答案: A

17. 原发性闭经, 孕激素试验未引起子宫出血, 再给予雌激素-孕酮序贯疗法也未引起出血, 请指出功能异常的部位

- A. 丘脑下部
- B. 垂体
- C. 肾上腺
- D. 卵巢
- E. 子宫

参考答案: E

18. 继发性闭经, 溢乳, 常见的原因, 错误的是

- A. 泌乳素瘤
- B. 口服避孕药
- C. 长期服氯丙秦
- D. 多囊卵巢综合征
- E. 高催乳素血症

参考答案: D

19. 继发性闭经, 血 FSH 升高, 雌激素水平降低, 常见于

- A. 卵巢功能早衰
- B. 多囊卵巢综合征
- C. 子宫内膜结核
- D. 席汉氏综合征
- E. 神经性厌食

参考答案: A

20. 18岁, 继发闭经8个月, 雌激素试验(+), 血 FSH, LH 均低, 垂体兴奋试验注射后45分钟 LH 值增高3倍, 闭经原因是

- A. 神经性厌食
- B. Turner 综合征
- C. 卵巢功能早衰
- D. 甲状腺功能低下
- E. 结核性子宫内膜炎

参考答案: A

21. 32岁, 闭经3年, 以往月经稀发, 每3-4月一次, 阴道涂片雌激素水平高度低落, 黄体酮试验(-), 雌激素试验(+), 血清 FSH 值升高, B 超子宫正常大小, 应诊断为

- A. 子宫性闭经
- B. 丘脑下部闭经
- C. 垂体性闭经
- D. 卵巢性闭经
- E. 其它内分泌疾病所致的闭经

参考答案: D

22. 26岁, 不孕3年, 继发闭经4个月, 检查: 无卵巢增大及多毛症, 肌注黄体酮20mg 3天, 停药7天后有子宫出血, 血 FSH, LH 低值, 垂体兴奋试验, LHRH 注射后60分钟血中 LH 值升至注射前的3倍以上, 提示病变部位在

- A. 垂体
- B. 卵巢
- C. 子宫
- D. 丘脑下部
- E. 肾上腺

参考答案: D

患女, 17岁, 于初潮后月经一直紊乱, 有时大量阴道出血, 本次停经2月后持续阴道流血20余天, 量多, 体检呈重度贫血貌, 妇科检查无阳性发现。

23. 急需哪项辅助检查?

- A. 诊刮
- B. 血常规及血型
- C. B 超
- D. 检血 FSH, LH
- E. 检血 E

参考答案: B

24. 入院后首选的止血方法是:

- A. 性激素止血
- B. 止血药止血

C. 刮宫止血

D. 药物刮宫

E. 子宫收缩剂

参考答案：A

25. 止血成功后，下一步的治疗：

A. 增强体质，等待自然周期建立

B. 性激素控制周期

C. 促排卵治疗

D. 纠正贫血

E. 如复发再治疗

参考答案：B

26. 10年后再次就诊，诉正常月经周期从未建立，婚后2年未孕，首选的辅助检查：

A. 诊断性刮宫

B. 子宫输卵管造影术

C. 盆腔B超

D. 检血FSH、LH

E. 腹腔镜检查

参考答案：A

27. 为解决生育问题，应采取的最佳治疗是：

A. 促排卵治疗

B. 人工授精

C. 孕激素维持黄体

D. 基础体温上升后HCG注射

E. 人工周期治疗

参考答案：A

28. 经治疗后妊娠并得足月儿，产后病情依旧，应采取的措施是：

A. 子宫切除

B. 卵巢切除

C. 定期观察

D. 定期诊刮

E. 恰当激素治疗

参考答案：E

B型题

A. 月经间隔时间正常，但经期延长9-10天，量多

B. 月经周期紊乱，经期长短不一，出血时多，时少

C. 月经周期缩短，月经频发

D. 月经周期正常，量多

E. 月经中期出血，量少

29. 无排卵型功血

30. 子宫内膜脱落不全

31. 黄体功能不全

参考答案：29: B 30: A 31: C

A. 雌激素

B. 孕激素

C. hMG

D. 氯底酚胺

E. 溴隐停

32. 闭经溢乳综合征时选用

33. 治疗功血时行药物刮宫时选用

34. 卵巢垂体功能正常，丘脑下部功能不足者选用

35. 垂体功能不全，有生育要求者选用

参考答案：32. E 33. B 34. D 35. C

第十九单元 子宫内膜异位症和子宫腺肌病

1. 盆腔子宫内膜异位症，最常见的部位是

A. 卵巢 B. 阔韧带

C. 宫骶韧带 D. 输卵管

E. 子宫直肠陷凹

参考答案：A

2. 子宫内膜异位症确定诊断最有效的辅助检查方法是

A. B超检查 B. 腹腔镜检查

C. 宫腔镜检查 D. 子宫输卵管碘油造影

E. 诊断性刮宫

参考答案：B

3. 关于盆腔子宫内膜异位症，正确的是

A. 子宫内膜异位症的发病为异位内膜随卵巢激素变化

而发生的周期性出血

B. 子宫内膜异位症具有远处转移和种植能力，故为癌前病变

C. 卵巢子宫内膜异位症较少见

D. 卵巢巧克力囊肿最大不超过8cm

E. 卵巢子宫内膜异位囊肿，最恰当的治疗方法是手术切除

参考答案：A

4. 丹那唑治疗子宫内膜异位症的药理作用，错误的是

- A. 抑制下丘脑性腺激素释放激素和/或垂体促性腺激素
- B. 直接与子宫内膜雌、孕激素受体结合
- C. 直接抑制卵巢甾体激素的产生
- D. 增加体内雌二醇和孕酮的清除率
- E. 促使异位内膜转变为增殖期子宫内膜

参考答案：E

5. 35岁，婚后5年未孕，2年来经血量增多，伴经期腹痛加重，妇科检查：后穹窿可及黄豆大小数个触痛结节，子宫后位，略大，质中等，活动差，子宫右侧可及5×6×4cm包块，质韧，不活动，压疼，此患者最可能的诊断是

- A. 子宫浆膜下肌瘤
- B. 子宫腺肌症
- C. 子宫内膜异位症，伴右卵巢巧克力囊肿
- D. 右侧卵巢畸胎瘤
- E. 结核性盆腔包块

参考答案：C

6. 28岁，孕3产1，确诊为双侧卵巢巧克力囊肿，左侧肿物8×8×9cm，右侧肿物5×5×4cm，最适宜的处理原则是

- A. 经阴道后穹隆穿刺抽液治疗
- B. 假孕治疗
- C. 假绝经治疗
- D. 保留卵巢功能手术
- E. 根治性手术

参考答案：D

7. 34岁女性，痛经5年，逐渐加重就诊，孕2产1，5年前人工流产1次，以后不孕。门诊：子宫后位孕6周大，不活动，阴道后穹窿部有0.5cm×0.3cm结节2个，明显触痛，B超见左附件区有8cm×6cm×5cm囊性肿物，壁厚

7. 对此患者的诊断，首先应该想到：

- A. 子宫内膜异位症
- B. 卵巢癌
- C. 子宫肌瘤合并慢性盆腔炎
- D. 盆腔结核
- E. 子宫肌炎合并卵巢囊肿

参考答案：A

8. 目前可用的辅助诊断手段中，应选择哪种？

- A. 诊断性刮宫
- B. 宫腔镜
- C. B超下穿刺附件肿物
- D. 腹腔镜
- E. 子宫输卵管碘油造影

参考答案：D

39岁，经期腹痛进行性加重5年，G2P15年前人工流产后未避孕。妇科检查：阴道后穹窿可触及0.5×0.3cm结节数个，子宫后位如孕7周大小，质中等，不活动，左附件可及6×5×4cm囊3个，质囊感，不活动，有轻压疼

9. 此患者的正确诊断是

- A. 子宫肌瘤并左卵巢囊肿
- B. 盆腔结核
- C. 子宫内膜异位症
- D. 早期妊娠
- E. 左附件恶性肿瘤

参考答案：C

10. 对此患者选用的辅助检查中，哪项最可靠

- A. 诊断性刮宫术
- B. 宫腔镜检查
- C. 腹部B超检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 血HCG检查

参考答案：D

11. 对此患者采取的最佳处理方式是

- A. 高效孕激素同期疗法
- B. 雄激素疗法
- C. 腹腔镜下手术穿刺
- D. 左附件切除术
- E. 子宫切除及盆腔内病灶切除术

参考答案：E

第二十单元 女性生殖器官损伤性疾病

1. 女，56岁。阴道脱出肿物2年。妇科检查：阴道前壁膨出，宫颈光滑，用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外。该患者应诊断为阴道前壁膨出和子宫脱垂

A. I度轻型

- B. I 度重型
- C. II 度轻型
- D. II 度重型
- E. III 度

1. 答案: D

【考点精要】**子宫脱垂的分度诊断**

【解析】我国根据患者平卧用力向下屏气时子宫下降最低点将子宫脱垂分为：I度：轻型—宫颈外口距离处女膜缘小于4cm；重型—宫颈外口已达处女膜缘，阴道口见到宫颈。II度：轻型—宫颈已脱出阴道口，宫体仍在阴道内；重型—宫颈或部分宫体已脱出阴道口外。III度：宫颈和宫体全部脱出至阴道口外。该例患者用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外符合II度重型诊断。

2. 37岁妇女，因阴部有块物脱出就诊。妇科检查见部分宫体与宫颈外露于阴道口，宫颈较长。本例恰当处理应是(2002)

- A. 阴道前后壁术
- B. Manchester 术
- C. 阴道纵隔形成术
- D. 阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术
- E. 经腹子宫全切除术

2. 答案: B

【考点精要】**子宫脱垂的治疗**

【解析】子宫脱垂的手术治疗术式有：①阴道前后壁修补术，适用于I、II度阴道前、后壁脱垂患者；②阴道前后壁修补、主韧带缩短及宫颈部分切除术，又称Manchester术，适用于年龄较轻，要求保留生育功能，宫颈较长的II、III度子宫脱垂伴阴道前、后壁脱垂患者；③经阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术，适用于II、III度子宫脱垂伴阴道前、后壁脱垂、年龄较大、不需保留子宫的患者；④阴道纵隔形成术，又称LeFort手术或阴道封闭术，适用于年老体弱不能耐受较大手术、不需保留性交功能者；⑤阴道、子宫悬吊术。本例患者较年轻，部分宫体与宫颈外露于阴道口属于II度重型子宫脱垂，并有宫颈较长，应选择Manchester术。

B型题

- A. 补中益气汤等支持疗法
- B. 子宫托
- C. 曼氏手术(阴道前后壁修补，主韧带缩短及宫颈部分切除)
- D. 阴道子宫全切及阴道前后壁修补
- E. 阴道纵隔形成术

以下病例应选何种处理

- 12. 40岁，II度脱垂及阴道壁膨出
- 13. 32岁，II度脱垂要求保留生育功能
- 14. 35岁，I度脱垂轻

参考答案: 12. D 13. C 14. A

第二十一单元 不孕症

- 1. 有关不孕症的概念，错误的是
- A. 不孕症指有正常性生活，未避孕，同居2年而未能受孕者
- B. 不孕主要原因在男方
- C. 原发不孕指婚后从未受孕
- D. 曾经怀孕而后又不孕者称继发不孕
- E. 根据不孕的原因可分为相对不孕及绝对不孕

参考答案: B

- 2. 导致女方不孕最常见的因素是
- A. 子宫因素
- B. 子宫颈因素
- C. 输卵管因素
- D. 外阴，阴道因素
- E. 排卵障碍

参考答案: C

- 4. 临床首选的促排卵药是
- A. 黄体生成激素释放激素(LHRH)
- B. 溴隐亭
- C. 氯底酚胺
- D. 绒毛膜促性腺激素(hCG)
- E. 绝经期促性腺激素(hMG)

参考答案: C

5. 28岁，有正常性生活，婚后3年未孕，既往体健，月经规则4-5/28天，血量中等，妇科盆腔检查正常，男方检查未发现异常，为确定不孕的原因，首先应采取的特殊检查是

- A. 经前期取子宫内膜组织学检查
- B. 子宫输卵管碘油造影
- C. 输卵管通液术
- D. 宫腔镜检查
- E. 基础体温测定

参考答案: A

B型题

- A. 绒毛膜促性腺激素(hCG)

- B. 绝经期促性腺激素(hMG)
- C. 己烯雌酚
- D. 溴隐亭
- E. LHRH
- 6. 促进黄体分泌功能
- 7. 促进宫颈粘液变为稀薄,利于精子穿过
- 8. 适用于下丘脑性无排卵
- 9. 促使卵泡生长发育成熟

参考答案: 6. A 7. C 8. E 9. B

第二十二单元 计划生育

- 1. 关于宫内节育器的避孕原理,错误的是
- A. 宫内节育器放置于子宫内,不会引起非细菌性之异物反应
- B. 可产生明显的吞噬细胞活动,抑制受精卵和胚胎的正常发育
- C. 可损伤子宫内膜而产生前列腺素
- D. 带铜节育器可妨碍受精卵着床
- E. 带孕酮节育器可使宫颈粘液变稠,妨碍精子运行

参考答案: A

- 2. 关于短效口服避孕药的避孕原理,正确的是
- A. 加速孕卵在输卵管内运行速度,使与子宫内膜的发育不同步
- B. 雌激素使宫颈粘液量增多,粘稠度增加,不利于精子穿透
- C. 子宫内膜受药物中孕激素作用,增殖被抑制,腺体发育不良
- D. 孕激素量少,使子宫内膜腺体发育不良
- E. 影响丘脑下部的GnRH,促使FSH和LH的分泌

参考答案: C

- 3. 关于女用短效口服避孕药的副作用,正确的是
- A. 闭经反而是由于孕激素刺激胃粘膜所致
- B. 服药期间在月经周期前半期发生不规则少量出血,系雌激素不足引起
- C. 能使经期延长,经量增多,故不适用经量多的妇女
- D. 白带增多是孕激素作用的结果
- E. 体重增加系孕激素引起钠水潴留的结果

参考答案: B

- 4. 关于人工流产,正确的是
- A. 妊娠10-14周行吸宫术
- B. 妊娠10周行钳刮术
- C. 人工流产仅指负压吸宫术
- D. 带器妊娠不能行人工流产术
- E. 术后检查吸出物有绒毛胎囊

参考答案: E

- 5. 关于人工流产吸宫术的并发症,正确的是
- A. 空气栓塞为常见的并发症
- B. 子宫穿孔多是子宫位置及大小检查不清所致
- C. 人工流产综合征是由于心脏病引起的
- D. 术后闭经都是由于宫颈粘连所致
- E. 术后持续阴道出血主要由于感染所致

参考答案: B

- 6. 关于避孕方法,下述哪项最不可靠
- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 安全期避孕
- D. 阴道隔膜
- E. 避孕套

参考答案: C

- 7. 关于口服避孕药,开始服用时间下列哪项是正确的
- A. 月经第1天
- B. 月经第3天
- C. 月经第5天
- D. 月经第7天
- E. 月经干净后

参考答案: C

- 8. 宫内节育器和甾体类避孕药相同的机理是
- A. 子宫内膜非细菌性异物反应
- B. 产生前列腺素
- C. 不利孕卵着床
- D. 抑制卵泡的正常发育和排卵
- E. 吞噬细胞功能明显活跃

参考答案: C

- 9. 30岁,多次行人工流产术,末次人流在3个月内,人流后停经3个月,有周期性下腹痛伴肛门坠感,妇检:宫颈举痛(+),子宫稍大有压痛,诊断可能是

- A. 早孕
- B. 内膜异位
- C. 宫颈粘连
- D. 宫外孕
- E. 月经不调

参考答案: C

10. 患者吸宫流产手术中, 感胸闷. 头晕. 检查: 血压 70/50mmHg, 脉搏 50 次/分, 应首先选用何种药物抢救治疗

- A. 安定
- B. 阿托品
- C. 杜冷丁
- D. 苯巴比妥钠
- E. 氯丙嗪

参考答案: B

11. 第二胎产妇, 产后半年月经未复潮, 仍在哺乳, 要求避孕, 检查: 子宫颈光滑, 外口松, 宫颈位于阴道口以上 2 厘米处, 子宫大小正常, 后倾, 无压痛, 活动, 双附件无异常, 选用下列何法为好

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 阴茎套
- D. 安全期避孕
- E. 体外排精法

参考答案: C

12. 30 岁 G5P1 月经 3-4/24-25 天, 血量中等, 体检: 阴道前后壁膨出, 宫颈重度糜烂, 宫口松, 子宫后位正常大小, 附件(-), 何法避孕最好

- A. 阴道膈膜
- B. 宫内节育器
- C. 口服避孕药
- D. 阴茎套
- E. 安全期避孕

参考答案: C

第二十三单元 妇女保健

1. 产时保健“五防”不包括

- A 防窒息
- B 防早产
- C 防滞产
- D 防出血
- E 防产伤

参考答案: B

2. 下述哪项不是妇女保护的“五期”

- A 产期
- B 孕期
- C 围绝经期
- D 月经期
- E 青春期

参考答案: E

3. 妇女保健工作的目的不包括

- A 促进妇女身心健康
- B 降低孕产妇死亡率
- C 降低围生儿死亡率
- D 控制 STD 的传播
- E 控制人口出生率

参考答案: E