

单项选择题（每题 1 分，共 236 题）

1、控制癫痫复杂部分发作最有效的药物是【B】

A、苯巴比妥

B、卡马西平

C、丙戊酸钠

D、硝西洋

E、苯妥英钠

2、关于苯二氮卓类的叙述，哪项是错误的【E】

A、是最常用的镇静催眠药

B、治疗焦虑症有效

C、可用于小儿高热惊厥

D、可用于心脏电复律前给药

E、长期用药不产生耐受性和依赖性

3、治疗三叉神经痛首选【D】

A、苯妥英钠

B、扑米酮

C、哌替啶

D、卡马西平

E、阿司匹林

4、对癫痫小发作疗效最好的药物是【A】

A、乙琥胺

B、卡马西平

C、丙戊酸钠

D、地西洋

E、扑米酮

5、治疗癫痫持续状态的首选药物是【D】

A、苯妥英钠

B、苯巴比妥钠

C、硫喷妥钠

D、地西洋

E、水合氯醛

6、一临产孕妇，突感头痛，恶心，相继发生抽搐，查血压为 22.0/14.6kPa，下肢浮肿。对此病人最适用哪种抗惊药【D】

A、地西洋

B、水合氯醛

C、苯巴比妥钠

D、硫酸镁

E、硫喷妥钠

7、一名癫痫大发作的患者，因服用过量的苯巴比妥而引起昏迷，呼吸微弱，送医院急救。[问](#)，不该采取哪项措施【D】

A、人工呼吸

B、静滴呋塞米

C、静滴碳酸氢钠

D、静滴氯化铵

E、静滴贝美格

8、对各类癫痫都有效的药物是【D】

A、乙琥胺

B、苯妥英钠

C、地西洋

D、氯硝西洋

E、卡马西平

9、可引起肺纤维化的药物是【D】

A、奎尼丁

B、普鲁卡因胺

C、利多卡因

D、胺碘酮

E、维拉帕米

10、长期用药可引起全身红斑狼疮样综合征的药物是【B】

A、奎尼丁

B、普鲁卡因胺

C、利多卡因

D、胺碘酮

E、维拉帕米

11、强心苷对哪种心衰的疗效最好【E】

A、肺源性心脏病引起

B、严重二尖瓣狭窄引起的

C、甲状腺机能亢进引起的

D、严重贫血引起的

E、高血压或瓣膜病引起的

12、地高辛的 $t_{1/2}=33$ 小时，按每日给予治疗量，问血药浓度何时达到稳态【B】

A、3 天

B、6 天

C、9 天

D、12 天

E、15 天

13、关于强心苷，哪一项是错误的【B】

A、有正性肌力作用

B、有正性心肌舒张功能

C、有负性频率作用

D、安全范围小

E、用于治疗心衰，也可治疗室上性心动过速

14、脑压过高，为预防脑疝最好选用【E】

A、呋塞米

B、阿米洛利

C、螺内酯

D、乙酰唑胺

E、甘露醇

15、男 34 岁，建筑工人，一次事故严重外伤，大量出血，血压下降少尿，经抢救低血压和血容量已纠正后，尿量仍很少，为避免肾功能衰竭的进展，应给哪种药物【B】

A、氢氯噻嗪

B、呋塞米

C、螺内酯

D、氨苯蝶啶

E、卡托普利

16、女，40岁，因风湿性心脏病出现心衰，心功Ⅱ级，并有下肢水肿，经地高辛治疗后，心功有改善，但水肿不见好转，检查发现：血浆醛固酮水平高，此时最好选用【C】

- A、呋塞米
- B、氢氯噻嗪
- C、螺内酯
- D、丁苯氧酸
- E、氨苯蝶啶

17、对抗醛固酮作用的药物是【D】

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、氨苯蝶啶
- D、螺内酯
- E、阿米洛利

18、发挥作用最慢的利尿药是【D】

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、氨苯蝶啶
- D、螺内酯
- E、阿米洛利

19、作基础降压药宜选【A】

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、氨苯蝶啶

D、螺内酯

E、阿米洛利

20、阿司匹林引起胃粘膜出血最好选用【E】

A、氢氧化铝

B、奥美拉唑

C、西米替丁

D、哌仑西平

E、米索前列醇

21、奥美拉唑抑制胃酸分泌的机制是【B】

A、阻断 H₂ 受体

B、抑制胃壁细胞 H⁺泵的功能

C、阻断 M 受体

D、阻断胃泌素受体

E、直接抑制胃酸分泌

22、关于奥美拉唑，哪一项是错误的【D】

A、是目前抑制胃酸分泌作用最强的

B、抑制胃壁细胞 H⁺泵作用

C、也能使胃泌素分泌增加

D、是 H₂ 受体阻断药

E、对消化性溃疡和反流性食管炎效果好

23、哪一项不是奥美拉唑的不良反应【C】

A、口干，恶心

B、头晕，失眠

C、胃粘膜出血

D、外周神经炎

E、男性乳房女性化

24、H⁺泵抑制药是【B】

A、哌仑西平

B、奥美拉唑

C、胶体碱，枸橼酸铋

D、丙谷胺

E、法莫替丁

25、M受体阻断药是【A】

A、哌仑西平

B、奥美拉唑

C、胶体碱，枸橼酸铋

D、丙谷胺

E、法莫替丁

26、胃泌素受体阻断药【D】

A、哌仑西平

B、奥美拉唑

C、胶体碱，枸橼酸铋

D、丙谷胺

E、法莫替丁

27、小剂量缩宫素可用于【C】

A、催产

B、产后止血

C、催产，引产

D、催产，泌乳

E、催产，止血

28、较大剂量缩宫素可用于【B】

A、催产

B、产后止血

C、引产

D、泌乳

E、催产，引产

29、过量缩宫素可致子宫平滑肌【E】

A、收缩

B、强直性收缩

C、舒张

D、持续性收缩

E、持续性强直收缩

30、麦角新碱不具有下述哪种作用【E】

A、子宫兴奋

B、收缩动脉

C、收缩静脉

D、大剂量收缩血管内皮细胞

E、阻断 α 受体

31、麦角生物碱在临床不能用于【B】

A、治疗子宫出血

B、催产，引产

C、加速产后子宫复原

D、偏头痛

E、冬眠合剂的配伍成分

32、糖皮质激素【D】

A、小剂量抑制体液免疫，大剂量抑制细胞免疫

B、可直接中和细菌内毒素和细菌外毒素

C、抑制胃酸分泌，促进胃粘液分泌

D、能兴奋中枢，出现欣快，激动等，甚至可诱发精神病

E、能明显增加血液中性粒细胞数，增强其游走吞噬功能

33、糖皮质激素不具有哪些药理作用【D】

A、快速强大的抗炎作用

B、抑制细胞免疫和体液免疫

C、提高机体对细菌内毒素的耐受力

D、提高机体对细菌外毒素的耐受力

E、增加血中白细胞数量，但却抑制其功能

34、糖皮质激素对血液系统的影响是【A】

A、中性粒细胞的数量增加

B、中性粒细胞的数量减少

C、红细胞的数量减少

D、血小板的数量减少

E、红细胞数和Hb均减少

35、关于糖皮质激素的应用，下列哪项是错误的【A】

A、水痘和带状疱疹

B、风湿和类风湿性关节炎

C、血小板减少症和再生障碍性贫血

D、过敏性休克和心源性休克

E、中毒性肺炎，重症伤寒和急性粟粒性肺结核

36、严重肝功能不全的病人不宜用【D】

A、氢化可的松

B、甲泼尼龙

C、泼尼松龙

D、泼尼松

E、地塞米松

37、长期大量应用糖皮质激素可引起哪种不良反应【E】

A、高血钾

B、低血压

C、低血糖

D、高血钙

E、水钠潴留

38、水钠潴留作用最弱的糖皮质激素是【D】

A、泼尼松

B、泼尼松龙

C、甲泼尼龙

D、地塞米松

E、氢化可的松

39、一般说来，下列哪项不是糖皮质激素的禁忌证【A】

A、急性粟粒性肺结核

B、糖尿病

C、水痘

D、活动性消化性溃疡病

E、孕妇

40、男，60岁，患风湿性关节炎，口服泼尼松和多种非甾体抗炎药5个月，近日突发自发性胫骨骨折，其原因可能与哪种药物有关【D】

A、阿司匹林

B、吲哚美辛

C、布洛芬

D、泼尼松

E、保泰松

41、女，25岁，平素易患咽炎，扁桃体炎，近来不规则低热3个月，膝、踝关节红肿、热、痛明显，小腿有散在红斑，心肺（-），WBC增多，患慢性迁延性肝炎多年，不宜选用的药物是【B】

A、氢化可的松

B、泼尼松

C、泼尼松龙

D、阿司匹林

E、布洛芬

42、全身用药抗炎作用最强，作用持续时间最长的糖皮质激素是【B】

A、米托坦

B、地塞米松

C、可的松

D、氟轻松

E、甲泼尼松

43、不能作全身应用，而只能外用的糖皮质激素是【D】

A、米托坦

B、地塞米松

C、可的松

D、氟轻松

E、甲泼尼松

44、抗炎作用最强，作用持续时间最短的糖皮质激素是【C】

A、米托坦

B、地塞米松

C、可的松

D、氟轻松

E、甲泼尼松

45、甲状腺激素不具哪项药理作用【C】

A、维持生长发育

B、增强心脏对儿茶酚胺的敏感性

C、维持血液系统功能正常

D、维持神经系统功能发育

E、促进代谢

46、治疗粘液性水肿的药物是【D】

A、甲基硫氧嘧啶

B、甲硫咪唑

C、碘制剂

D、甲状腺素

E、甲亢平

47、关于 T3 和 T4，下列哪项叙述是正确的【B】

A、T3 的血浆蛋白结合率高于 T4

- B、T3 起效快，作用强
- C、T3 起效慢，作用持久
- D、T3 起效快，作用持久
- E、T3 起效慢，作用弱

48、能抑制甲状腺素合成，又抑制外周组织中 T4 变为 T3，还抑制免疫球蛋白生成的药物【C】

- A、碘化物
- B、甲硫咪唑
- C、丙基硫氧嘧啶
- D、甲亢平
- E、普萘洛尔

49、不宜用作甲亢常规治疗的药物是【A】

- A、碘化物
- B、甲基硫氧嘧啶
- C、丙基硫氧嘧啶
- D、甲硫咪唑
- E、卡比马唑

50、青少年甲亢患者，内科常规治疗药物为【A】

- A、丙基硫氧嘧啶
- B、普萘洛尔
- C、甲状腺素
- D、¹³¹I
- E、碘化钾

51、能明显缓解甲亢患者交感神经兴奋症状，并能抑制 T4 变为 T3，但不引起粒细胞缺乏的药物是【A】

- A、普萘洛尔
- B、甲基硫氧嘧啶
- C、丙基硫氧嘧啶
- D、甲硫咪唑
- E、卡比马唑

52、女，43 岁，患甲亢 3 年，需行甲状腺部分切除术，正确的术前准备是【C】

- A、术前两周给丙基硫氧嘧啶+普萘洛尔
- B、术前两周给丙基硫氧嘧啶+小剂量碘剂
- C、术前两周给丙基硫氧嘧啶+大剂量碘剂
- D、术前两周给丙基硫氧嘧啶
- E、术前两周给卡比马唑

53、非选择性的钙拮抗剂是【A】

- A、氟桂嗪
- B、硝苯地平
- C、地尔硫卓
- D、维拉帕米
- E、氨氯地平

54、治疗阵发性室上性心动过速的首选药是【C】

- A、奎尼丁
- B、苯妥英钠
- C、维拉帕米

D、普萘洛尔

E、利多卡因

55、治疗地高辛引起的室性期前收缩（室早）的首选药是【B】

A、奎尼丁

B、苯妥英钠

C、利多卡因

D、胺碘酮

E、普鲁卡因胺

56、治疗急性心肌梗死引起的室性心动过速的首选药是【D】

A、奎尼丁

B、普鲁卡因胺

C、普萘洛尔

D、利多卡因

E、维拉帕米

57、哪种药物对心房颤动无效【E】

A、奎尼丁

B、地高辛

C、普萘洛尔

D、胺碘酮

E、利多卡因

58、对地高辛引起的窦性心动过缓和轻度房室传导阻滞最好选用【A】

A、阿托品

B、异丙肾上腺素

C、苯妥英钠

D、肾上腺素

E、氯化钾

59、奎尼丁最严重的不良反应是【C】

A、金鸡纳反应

B、药热，血小板减少

C、奎尼丁晕厥

D、胃肠道反应

E、心室率加快

60、胺碘酮的作用是【D】

A、阻滞 Na^+ 通道

B、促 K^+ 外流

C、阻滞 Ca^{2+} 通道

D、延长动作电位时程

E、阻滞 β 受体

61、利多卡因对哪种心律失常无效【C】

A、心室颤动

B、室性期前收缩

C、室上性心动过速

D、强心苷引起的室性心律失常

E、心肌梗死所致的室性早搏

62、关于普萘洛尔，抗心律失常的机制，哪项是错误的【D】

A、阻断心肌 β 受体

B、降低窦房结的自律性

C、降低普氏纤维的自律性

D、治疗量就延长普氏纤维的有效不应期

E、延长房室结的有效不应期

63、关于利多卡因的抗心律失常作用，哪一项是错误的【E】

A、是窄谱抗心律失常药

B、能缩短普氏纤维的动作电位时程和有效不应期

C、对传导速度的作用，受细胞外液 K^+ 浓度的影响

D、对心肌的直接作用是抑 Na^+ 内流，促 K^+ 外流

E、治疗剂量就能降低窦房结的自律性

64、抗心律失常谱广而 $t_{1/2}$ 长的药物是【C】

A、奎尼丁

B、普萘洛尔

C、胺碘酮

D、普罗帕酮

E、普鲁卡因胺

65、关于普罗帕酮，哪项是错误的【E】

A、口服吸收完全，生物利用率低

B、有 β 受体阻断作用

C、主要降低希普氏纤维的自律性

D、减慢希普纤维的传导速度

E、是一个很安全的常用的广谱抗心律失常药

66、女，54岁，有甲亢的病史，近日因过劳和精神受刺激，而出现失眠，心慌，胸闷。体检见心率160次/分，心电有明显的心肌缺血改变，窦性心律不齐。此时最好选用【D】

A、胺碘酮

- B、奎尼丁
- C、普鲁卡因胺
- D、普萘洛尔
- E、利多卡因

67、男，42岁，因心慌，胸闷5天入院，心电图显示频发性室性早搏，宜选用哪种抗心律失常药【A】

- A、胺碘酮
- B、索他洛尔
- C、美西律
- D、奎尼丁
- E、普罗帕酮

68、女，45岁，有心肌缺血病史，经治疗后几年来一直健康。近日突然出现心慌，气短，数分钟后能自然缓解，如此，每日可发作数次，发作时常伴有心绞痛的症状。经心电图检查认为阵发性室上性心动过速，此时最好选用【C】

- A、普鲁卡因胺
- B、硝苯地平
- C、维拉帕米
- D、索他洛尔
- E、普罗帕酮

69、可影响甲状腺功能的药物是【D】

- A、奎尼丁
- B、普鲁卡因胺
- C、利多卡因
- D、胺碘酮
- E、维拉帕米

70、能诱导肝药酶加速自身代谢的药物是【B】

- A、乙琥胺
- B、苯妥英钠
- C、地西洋
- D、氯硝西洋
- E、卡马西平

71、对癫痫小发作最好选用【A】

- A、乙琥胺
- B、苯妥英钠
- C、地西洋
- D、氯硝西洋
- E、卡马西平

72、增加左旋多巴疗效，减少不良反应的药物是【A】

- A、卡比多巴
- B、维生素 B6
- C、利血平
- D、苯海索
- E、苯乙肼

73、溴隐亭治疗帕金森病的作用机制是【B】

- A、中枢抗胆碱作用
- B、激活多巴胺受体
- C、减少多巴胺降解
- D、抑制多巴胺再摄取
- E、提高脑内多巴胺浓度

74、左旋多巴抗帕金森病的作用机制是【C】

- A、在外周脱羧变成多巴胺起作用
- B、促进脑内多巴胺能神经释放递质起作用
- C、进入脑后脱羧生成多巴胺起作用
- D、在脑内直接激动多巴胺受体
- E、在脑内抑制多巴胺再摄取

75、对苯海索的叙述，哪项是错误的【C】

- A、阻断中枢胆碱受体
- B、对帕金森病疗效不如左旋多巴
- C、对氯丙嗪引起的震颤麻痹无效
- D、对僵直和运动困难疗效差
- E、外周抗胆碱作用比阿托品弱

76、男，45岁，因患严重精神分裂症，用氯丙嗪治疗，两年来用的氯丙嗪量逐渐增加至600mg/d，才能较满意的控制症状，但近日出现肌肉震颤，动作迟缓，流涎等症状，对此，应选何药纠正【A】

- A、苯海索
- B、左旋多巴
- C、金刚烷胺
- D、地西泮
- E、溴隐亭

77、氯丙嗪治疗精神分裂症时最常见的不良反应是【D】

- A、体位性低血压
- B、过敏反应
- C、内分泌障碍

D、锥体外系反应

E、消化系统症状

78、关于氯丙嗪的应用，哪项是错误的【D】

A、人工冬眠疗法

B、精神分裂症

C、药物引起的呕吐

D、晕动病引起的呕吐

E、躁狂症

79、长期应用氯丙嗪的病人停药后易出现【C】

A、帕金森综合征

B、静坐不能

C、迟发性运动障碍

D、急性肌张力障碍

E、体位性低血压

80、局麻药引起局麻作用的电生理学机制是【B】

A、促进 Na^+ 内流

B、阻止 Na^+ 内流

C、促进 Ca^{2+} 内流

D、阻止 Ca^{2+} 内流

E、阻止 K^+ 外流

81、毒性最大的局麻药是【C】

A、普鲁卡因

B、利多卡因

C、丁卡因

D、布比卡因

E、依替卡因

82、局麻作用维持时间最长的药物是【D】

A、普鲁卡因

B、利多卡因

C、丁卡因

D、布比卡因

E、依替卡因

83、普鲁卡因不宜用于哪种麻醉【A】

A、表面麻醉

B、浸润麻醉

C、传导麻醉

D、硬膜外麻醉

E、蛛网膜下腔麻醉

84、地西洋抗焦虑的主要作用部位是【A】

A、边缘系统

B、大脑皮层

C、黑质纹状体

D、下丘脑

E、脑干网状结构

85、关于地西洋的叙述，哪项是错误的【C】

A、肌肉注射吸收慢而不规则

B、口服治疗量对呼吸和循环影响小

C、较大剂量易引起全身麻醉

D、可用于治疗癫痫持续状态

E、其代谢产物也有生物活性

86、苯二氮卓类药物的作用机制是【D】

A、直接和 GABA 受体结合，增加 GABA 神经元的功能

B、与苯二氮卓受体结合，生成新的抑制性蛋白起作用

C、不通过受体，直接抑制中枢神经系统的功能

D、与其受体结合后促进 GABA 与相应受体结合，增加 Cl^- 通道开放频率

E、与其受体结合后促进 GABA 与相应受体结合，增加 Cl^- 通道开放的时间

87、巴比妥类过量中毒，为促使其排泄加快，应当【C】

A、碱化尿液，使解离度增大，增加肾小管再吸收

B、碱化尿液，使解离度减小，增加肾小管再吸收

C、碱化尿液，使解离度增大，减少肾小管再吸收

D、酸化尿液，使解离度增大，减少肾小管再吸收

E、酸化尿液，使解离度减少，增加肾小管再吸收

88、兼有镇静，催眠，抗惊厥，抗癫痫作用的药物是【B】

A、苯妥英钠

B、苯巴比妥

C、水合氯醛

D、扑米酮

E、司可巴比妥

89、关于苯妥英钠，哪项是错误的【C】

A、不宜肌肉注射

B、无镇静催眠作用

C、抗癫痫作用与开放 Na^+ 通道有关

D、血药浓度过高则按零级动力学消除

E、有诱导肝药酶的作用

90、单纯性甲状腺肿选用【C】

A、甲基硫氧嘧啶

B、丙基硫氧嘧啶

C、甲状腺素

D、 ^{131}I

E、甲硫咪唑

91、甲亢危象选用【B】

A、甲基硫氧嘧啶

B、丙基硫氧嘧啶

C、甲状腺素

D、 ^{131}I

E、甲硫咪唑

92、硫脲类的主要不良反应是【B】

A、诱发心绞痛

B、粒细胞缺乏

C、甲状腺功能减退

D、血管神经性水肿

E、肝功能不良

93、甲状腺素的主要不良反应是【A】

A、诱发心绞痛

B、粒细胞缺乏

C、甲状腺功能减退

D、血管神经性水肿

E、肝功能不良

94、关于胰岛素的作用下列哪项是错的【B】

A、促进脂肪合成，抑制脂肪分解

B、抑制蛋白质合成，抑制氨基酸进入细胞

C、促进葡萄糖利用，抑制糖元分解和产生

D、促进钾进入细胞，降低血钾

E、促进蛋白质合成及氨基酸转运

95、下述哪种糖尿病不需首选胰岛素【C】

A、幼年重型糖尿病

B、合并严重感染的糖尿病

C、轻型糖尿病

D、需作手术的糖尿病人

E、合并妊娠的糖尿病人

96、下述不良反应哪项是胰岛素不具有的【E】

A、过敏

B、低血糖

C、急性耐受性

D、慢性耐受性

E、肝损伤

97、有严重肝病的糖尿病人禁用哪种降血糖药【A】

A、氯磺丙脲

B、甲苯磺丁脲

C、苯乙福明

D、胰岛素

E、甲福明

98、甲苯磺丁脲降血糖作用的主要机制是【C】

A、增强胰岛素的作用

B、促进葡萄糖分解

C、刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D、使细胞内 cAMP 减少

E、抑制胰高血糖素作用

99、有降血糖及抗利尿作用的药物是【B】

A、甲苯磺丁脲

B、氯磺丙脲

C、格列本脲

D、甲福明

E、苯乙福明

100、氯丙嗪引起的血压下降不能用哪种药纠正【B】

A、甲氧明

B、肾上腺素

C、去氧肾上腺素

D、去甲肾上腺素

E、间羟胺

101、氯丙嗪抗精神病的作用机制是阻断【C】

A、中枢 α 肾上腺素能受体

B、中枢 β 肾上腺素能受体

C、中脑 - 边缘系和中脑 - 皮质通路 D₂ 受体

D、黑质 - 纹状体通路中的 5-HT₁ 受体

E、结节 - 漏斗通路的 D₂ 受体

102、氯丙嗪引起锥体外系反应是由于阻断【B】

A、结节 - 漏斗通路中的 D₂ 受体

B、黑质 - 纹状体通路中的 D₂ 受体

C、中脑 - 边缘系中的 D₂ 受体

D、中脑 - 皮质通路中的 D₂ 受体

E、中枢 M 胆碱受体

103、米帕明（丙米嗪）抗抑郁症的机制是【D】

A、促进脑内 NA 和 5-HT 释放

B、抑制脑内 NA 和 5-HT 释放

C、促进脑内 NA 和 5-HT 再摄取

D、抑制脑内 NA 和 5-HT 再摄取

E、激活脑内 D₂ 受体

104、氟奋乃静的特点是【C】

A、抗精神病，镇静作用都较强

B、抗精神病，锥体外系反应都较弱

C、抗精神病，锥体外系反应都强

D、抗精神病，降压作用都较强

E、抗精神病作用较强，锥体外系反应较弱

105、躁狂症首选【A】

A、碳酸锂

B、米帕明

C、氯丙嗪

D、奋乃静

E、五氟利多

106、抑郁症首选【B】

A、碳酸锂

B、米帕明

C、氯丙嗪

D、奋乃静

E、五氟利多

107、血药浓度维持时间最长的是【E】

A、碳酸锂

B、米帕明

C、氯丙嗪

D、奋乃静

E、五氟利多

108、吗啡对中枢神经系统的作用是【B】

A、镇痛，镇静，催眠，呼吸抑制，止吐

B、镇痛，镇静，镇咳，缩瞳，致吐

C、镇痛，镇静，镇咳，呼吸兴奋

D、镇痛，镇静，止吐，呼吸抑制

E、镇痛，镇静，扩瞳，呼吸抑制

109、对心肌收缩力抑制作用最强的钙拮抗剂是【E】

A、尼莫地平

B、尼群地平

C、硝苯地平

D、地尔硫卓

E、维拉帕米

110、对脑血管扩张作用最强的药物是【B】

A、硝苯地平

B、尼莫地平

C、非洛地平

D、尼索地平

E、尼群地平

111、血浆半衰期最长钙拮抗剂是【C】

A、硝苯地平

B、尼卡地平

C、氨氯地平

D、尼索地平

E、尼群地平

112、维拉帕米对哪种心律失常疗效最好【D】

A、房室传导阻滞

B、室性心动过速

C、室性期前收缩

D、阵发性室上性心动过速

E、强心苷过量的心律失常

113、阵发性室上性心动过速首选【A】

A、维拉帕米

B、硝苯地平

C、尼卡地平

D、尼索地平

E、地尔硫卓

114、扩血管作用最强的钙拮抗剂是【C】

A、硝苯地平

B、尼卡地平

C、尼索地平

D、尼群地平

E、拉西地平

115、L型钙通道中的主要功能亚单位是【A】

A、 $\alpha 1$

B、 $\alpha 2$

C、 β

D、 γ

E、 δ

116、维拉帕米不能用于哪种疾病【C】

A、原发性高血压

B、心绞痛

C、慢性心动不全

D、室上性心动过速

E、心房纤颤

117、关于维拉帕米的叙述，哪项是错误的【E】

A、可用于治疗心绞痛

B、可用于治疗高血压

C、可用于治疗阵发性室上性心动过速

D、禁用于有传导阻滞的病人

E、禁用于心房纤颤的病人

118、关于硝苯地平，哪项是错误的【D】

A、是二氢吡啶类钙拮抗剂

B、口服吸收迅速而完全

C、主要的不良反应是低血压

D、可用于治疗心律失常

E、可用于治疗高血压和心绞痛

119、关于维拉帕米，哪项是错误的【B】

A、是治疗阵发性室上性心动过速的首选药

B、对肥厚性心肌病无效

C、能改善心室的舒张功能

D、禁用于严重心衰的病人

E、能增加缺血心肌的冠脉流量

120、男，62岁，因房颤入院，用地高辛后心室率得到控制，并以0.5mg/d地高辛维持。因病人有心绞痛病史，为预防心绞痛而用一种抗心绞痛的药物，用药期间病人出现传导阻滞，你认为最可能是合并应用了哪种药物【C】

A、硝酸甘油

B、硝苯地平

C、维拉帕米

D、硝酸异山梨酯

E、美托洛尔

121、男，58岁，因2天前突然严重头痛，恶心，呕吐，伴有颈项强直而入院，穿刺检查证明脑压增高，除一般治疗外，为防治脑血管痉挛，宜选用【E】

A、硝苯地平

B、维拉帕米

C、地尔硫卓

D、尼卡地平

E、氟桂嗪

122、选择性舒张脑血管的药物是【A】

A、氟桂嗪

B、硝苯地平

C、地尔硫卓

D、维拉帕米

E、氨氯地平

123、 $t_{1/2}$ 最长的药物是【E】

A、氟桂嗪

B、硝苯地平

C、地尔硫卓

D、维拉帕米

E、氨氯地平

124、易引起反射性交感神经兴奋心率加快的药物是【B】

A、氟桂嗪

B、硝苯地平

C、地尔硫卓

D、维拉帕米

E、氨氯地平

125、精蛋白锌胰岛素引起的低血糖反应症状有【E】

A、饥饿

- B、出汗
- C、肌肉震颤
- D、心悸
- E、精神情绪及运动障碍

126、降血糖作用最弱，作用持续时间最短的药物是【A】

- A、甲苯磺丁脲
- B、氯磺丙脲
- C、格列本脲
- D、格列吡嗪
- E、珠蛋白锌胰岛素

127、下列何种降血糖药易引起乳酸血症【E】

- A、正规胰岛素
- B、阿卡波糖
- C、格列本脲
- D、甲苯磺丁脲
- E、苯乙福明

128、不促进胰岛素释放，不加重肥胖的降糖药为【A】

- A、甲福明
- B、甲苯磺丁脲
- C、格列本脲
- D、格列吡嗪
- E、氯磺丙脲

129、对切除胰腺或重度糖尿病患者无效的降糖药为【B】

- A、阿卡波糖

B、格列齐特

C、甲福明

D、苯乙福明

E、珠蛋白锌胰岛素

130、肝素的抗凝血作用机制是【C】

A、抑制凝血因子的合成

B、直接灭活各种凝血因子

C、加速抗凝血酶III灭活各种凝血因子的作用

D、激活纤溶酶

E、抑制血小板聚集

131、哪种药物对抗肝素过量的自发性出血最有效【D】

A、维生素K

B、维生素C

C、垂体后叶素

D、鱼精蛋白

E、右旋糖酐

132、关于肝素，哪一项是错误的【E】

A、肝素过量能引起骨质疏松

B、肝素不能口服

C、肝素是通过抗凝血酶III起作用

D、肝素用量越大，其抗凝活性 $t_{1/2}$ 越长

E、肝素只在体外有抗凝血作用

133、双香豆素的抗凝血机制是【B】

A、能对抗凝血因子IIa、VIIa、IXa、Xa的作用

B、影响凝血因子 II、VII、IX、X 的合成

C、加速 ATIII 对凝血因子的灭活作用

D、激活纤溶酶

E、抑制血小板的聚集反应

134、关于香豆素类抗凝血药，哪一项是错误的【C】

A、发挥作用慢，维持时间长

B、维生素 K 能对抗其抗凝血作用

C、体内外都有抗凝血作用

D、口服就有抗凝血作用

E、华法林的作用比双香豆素出现作用快，维持时间短

135、能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物有【D】

A、阿司匹林

B、广谱抗生素

C、甲磺丁脲

D、苯巴比妥

E、西米替丁

136、阿司匹林抗血小板聚集的机制是【B】

A、增加 PGI₂ 的合成

B、促进 TXA₂ 的合成

C、阻止 TXA₂ 的降解

D、抑制血小板激活因子的作用

E、减少 PGI₂ 的降解

137、治疗急性血栓栓塞性疾病最好选【C】

A、肝素

- B、华法林
- C、尿激酶
- D、右旋糖酐
- E、双香豆素

138、对地高辛过量中毒，引起的心动过速，哪一项是不应采取的措施【A】

- A、用呋塞米加速排出
- B、停药
- C、给氯化钾
- D、给苯妥英钠
- E、给地高辛的特异性抗体

139、强心苷心脏毒性的发生机制是【B】

- A、激活心脏细胞膜 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶
- B、抑制心肌细胞膜 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶
- C、增加心肌细胞中的 K^+
- D、增加心肌细胞中的 Ca^{2+}
- E、增加心肌细胞中的 Na^+

140、地高辛治疗心房纤颤的主要作用是【C】

- A、缩短心房有效不应期
- B、抑制窦房结
- C、减慢房室传导
- D、降低普肯耶纤维的自律性
- E、直接降低心房的兴奋性

141、抗纤维蛋白溶解药是【A】

- A、氨甲苯酸

B、链激酶

C、组织纤溶酶原激活因子

D、双密达莫

E、华法林

142、对血栓部位有一定选择性的溶栓药是【C】

A、氨甲苯酸

B、链激酶

C、组织纤溶酶原激活因子

D、双密达莫

E、华法林

143、使 cAMP 升高抑制血小板聚集药物是【D】

A、氨甲苯酸

B、链激酶

C、组织纤溶酶原激活因子

D、双密达莫

E、华法林

144、H1 受体阻断药对哪种病最有效【B】

A、支气管哮喘

B、皮肤粘膜过敏症状

C、血清病高热

D、过敏性休克

E、过敏性紫癜

145、对异丙嗪，哪一项是错误的【C】

A、是 H1 受体阻断药

B、有明显的中枢抑制作用

C、能抑制胃酸分泌

D、有抗过敏作用

E、有止吐作用

146、对苯海拉明，哪一项是错误的【D】

A、可用于失眠的患者

B、可用于治疗荨麻疹

C、是 H₁ 受体阻断药

D、可治疗胃和十二指肠溃疡

E、可治疗过敏性鼻炎

147、对西米替丁，哪一项是错误的【A】

A、可用于治疗皮肤粘膜过敏症

B、是 H₂ 受体阻断药

C、可用于治疗胃和十二指肠溃疡

D、对反流性胃炎也有效

E、长期用药可引起性激素失调

148、关于雷尼替丁，哪一项是错误的【C】

A、是 H₂ 受体阻断药

B、抑制胃酸分泌作用比西米替丁强

C、也能中和胃酸，减轻对溃疡面的刺激

D、肝功能不良者 $t_{1/2}$ 明显延长

E、对基础胃酸和夜间胃酸分泌都抑制

149、关于平喘药物的作用，哪一项是错误的【E】

A、稳定肥大细胞膜

B、 β_2 受体激动

C、磷酸二酯酶抑制

D、M 受体阻断

E、直接松弛支气管平滑肌

150、关于平喘药的叙述哪一项是错误的【D】

A、肾上腺素也能收缩支气管粘膜的血管，有助于平喘

B、沙丁胺醇是 β_2 受体激动剂

C、异丙肾上腺素主要缺点是心率加快

D、阿托品可用于哮喘发作

E、色甘酸钠只能预防哮喘发作

151、急性哮喘发作首选【C】

A、色甘酸钠吸入

B、氨茶碱口服

C、沙丁胺醇吸入

D、麻黄碱口服

E、倍氯米松口服

152、色甘酸钠的作用机制是【C】

A、能对抗胆碱等过敏介质的作用

B、直接松弛支气管平滑肌

C、抑制肥大细胞脱颗粒反应

D、促进儿茶酚胺释放

E、阻断 M 受体

153、粘痰溶解剂是【B】

A、可待因

B、乙酰半胱氨酸

C、喷托维林

D、氯化铵

E、苯佐那酯

154、外周性镇咳药是【E】

A、可待因

B、乙酰半胱氨酸

C、喷托维林

D、氯化铵

E、苯佐那酯

155、非阿片类中枢性镇咳药是【C】

A、可待因

B、乙酰半胱氨酸

C、喷托维林

D、氯化铵

E、苯佐那酯

156、抑制胃酸分泌作用最强的是【C】

A、西米替丁

B、雷尼替丁

C、奥美拉唑

D、哌仑西平

E、丙谷胺

157、吗啡镇痛作用机制是【B】

A、阻断脑室，导水管周围灰质的阿片受体

- B、激动脑室，导水管周围灰质的阿片受体
- C、抑制前列腺素合成，降低对致痛物质的敏感性
- D、阻断大脑边缘系统的阿片受体
- E、激动中脑盖前核的阿片受体

158、吗啡主要用于【E】

- A、分娩镇痛
- B、胃肠绞痛
- C、肾绞痛
- D、慢性钝痛
- E、急性锐痛

159、吗啡的适应证是【C】

- A、分娩止痛
- B、支气管哮喘
- C、心源性哮喘
- D、颅脑外伤止痛
- E、感染性腹泻

160、心源性哮喘宜选用【D】

- A、肾上腺素
- B、去甲肾上腺素
- C、异丙肾上腺素
- D、哌替啶
- E、多巴胺

161、下列叙述中，错误的是【A】

- A、可待因的镇咳作用比吗啡强

B、等效镇痛剂量的哌替啶对呼吸的抑制程度与吗啡相等

C、喷他佐辛久用不易成瘾

D、吗啡是阿片受体的激动剂

E、吗啡和哌替啶都能用于心源性哮喘

162、吗啡不用于慢性钝痛是因为【C】

A、治疗量就能抑制呼吸

B、对钝痛的效果欠佳

C、连续多次应用易成瘾

D、引起体位性低血压

E、引起便秘和尿潴留

163、镇痛作用最强的药物是【B】

A、吗啡

B、芬太尼

C、哌替啶

D、喷他佐辛

E、美沙酮

164、成瘾性最小的镇痛药是【D】

A、吗啡

B、芬太尼

C、哌替啶

D、喷他佐辛

E、美沙酮

165、对癌症疼痛的病人应用镇痛药的原则哪项是错误的【C】

A、根据疼痛程度选择不同的药物

- B、对轻度疼痛选用解热镇痛药
- C、只有在疼痛时才给药
- D、对重度疼痛应当用强阿片类镇痛药
- E、保证病人不痛，不考虑成瘾的问题

166、癌痛治疗三阶梯方法中哪项是错误的【E】

- A、根据癌痛程度选药
- B、用药剂量要个体化
- C、要按时，而不按需（只在痛时）给药
- D、对轻度疼痛选用镇痛解热药
- E、不宜用强阿片药物，以免成瘾

167、男性患者 56 岁，有急性心肌梗死病史，经治疗好转后，停药月余，昨夜突发剧咳而憋醒，不能平卧，咳粉红色泡沫样痰，烦躁不安，心率 130 次/分，血压 21.3/12.6kPa，两肺有小水泡音。诊断为急性左心衰竭，心源性哮喘，问用哪组药物治疗最适宜【B】

- A、氢氯噻嗪+地高辛
- B、吗啡+毒毛花苷 K
- C、氢氯噻嗪+硝普钠
- D、氢氯噻嗪+卡托普利
- E、氢氯噻嗪+氨茶碱

168、阿片受体拮抗剂是【E】

- A、喷他佐辛
- B、罗通定
- C、曲马多
- D、芬太尼
- E、纳洛酮

169、镇痛作用最强的是【D】

- A、喷他佐辛
- B、罗通定
- C、曲马多
- D、芬太尼
- E、纳洛酮

170、镇痛解热抗炎药的作用机制是【C】

- A、直接抑制中枢神经系统
- B、直接抑制 PG 的生物效应
- C、抑制 PG 的生物合成
- D、减少 PG 的分解代谢
- E、减少缓激肽分解代谢

171、何种药物对阿司匹林引起的出血最有效【C】

- A、维生素 C
- B、氨甲苯酸
- C、维生素 K
- D、立止血
- E、酚磺乙胺

172、小量阿司匹林预防血栓形成的机制是【B】

- A、抑制磷脂酶
- B、抑制 TXA₂ 的合成
- C、减少 PGI₂ 的合成
- D、抑制凝血酶原
- E、减少花生四烯酸的合成

173、阿司匹林没有哪种作用【D】

- A、抑制环加氧酶
- B、抗炎抗风湿
- C、抑制 PG 合成，易造成胃粘膜损伤
- D、高剂量时才能抑制血小板聚集
- E、高剂量时也能抑制 PGI₂ 的合成

174、对镇痛解热抗炎药的正确叙述是【D】

- A、对各种疼痛都有效
- B、镇痛的作用部位主要在中枢
- C、对各种炎症都有效
- D、解热，镇痛和抗炎作用与抑制 PG 合成有关
- E、抑制缓激肽的生物合成

175、抑制 PG 合成酶作用最强的药物是【B】

- A、阿司匹林
- B、吲哚美辛
- C、保泰松
- D、对乙酰氨基酚
- E、布洛芬

176、解热镇痛作用强而抗炎作用很弱的药物是【E】

- A、吲哚美辛
- B、吡罗昔康
- C、布洛芬
- D、双氯芬酸
- E、对乙酰氨基酚

177、对痛风无效的药物是【B】

- A、保泰松
- B、羟基保泰松
- C、别嘌呤醇
- D、丙磺舒
- E、秋水仙碱

178、哪一项不是阿司匹林的不良反应【C】

- A、胃粘膜糜烂及出血
- B、出血时间延长
- C、溶血性贫血
- D、诱发哮喘
- E、血管神经性水肿

179、关于保泰松，哪一项是错误的【D】

- A、能诱导肝药酶，加速其自身代谢
- B、血浆 $t_{1/2}$ 约 2~3 天
- C、关节腔中的药物浓度维持时间长
- D、大剂量也不易引起胃肠道反应
- E、代谢产物也有生物活性

180、男，42 岁，有胃溃疡病史。近日发现手指关节肿胀，疼痛，早晨起床后感到指关节明显僵硬，活动后减轻，经化验后确诊为类风湿性关节炎，应选用哪种药物治疗【C】

- A、阿司匹林
- B、对乙酰氨基酚
- C、布洛芬

D、吲哚美辛

E、吡罗昔康

181、女，12岁，三周前患急性扁桃体炎。突然出现窦性心动过速，心搏微弱，心尖区有收缩期吹风样杂音，实验室检查有链球菌感染，确诊为急性风湿热，除用青霉素控制链球菌感染外，应选哪种药治疗【A】

A、阿司匹林

B、布洛芬

C、对乙酰氨基酚

D、保泰松

E、吲哚美辛

182、女，32岁，因气候突变，感到头痛，鼻塞，体温37.2℃，自认为感冒，便服阿司匹林一片，30分钟后突感不适，呼吸困难，大汗。产生这些症状的原因是【E】

A、阿司匹林过量

B、冷空气对呼吸道的刺激

C、阿司匹林增加TXA₂生成

D、阿司匹林抑制PGI₂的合成

E、阿司匹林抑制PG合成，使白三烯增多

183、某患者，患1型糖尿病多年，靠胰岛素控制病情，近日并发酮症酸中毒，使用胰岛素后病人头痛，头晕，视力模糊，言语不清，精神错乱，运动障碍症状，由何种胰岛素制剂引起【E】

A、正规胰岛素

B、高血糖素

C、低精蛋白锌胰岛素

D、珠蛋白锌胰岛素

E、精蛋白锌胰岛素

184、男，53岁，2型糖尿病，控制饮食无效，体重超重，过度肥胖，选下列哪种降糖药为最佳【E】

- A、格列齐特
- B、格列苯脲
- C、甲苯磺丁脲
- D、格列吡嗪
- E、甲福明

185、不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是【D】

- A、阿卡波糖
- B、甲苯磺丁脲
- C、苯乙福明
- D、甲福明
- E、A+B

186、对重度1型糖尿病无效的是【B】

- A、阿卡波糖
- B、甲苯磺丁脲
- C、苯乙福明
- D、甲福明
- E、A+B

187、哪种药物能防止和逆转慢性心功能不全的心室肥厚并能降低病死率【E】

- A、地高辛
- B、米力农
- C、氢氯噻嗪
- D、硝普钠

E、卡托普利

188、能扩张小动脉，小静脉，作用强大而短暂，可用于治疗慢性心功不全急性发作的扩血管药是【C】

A、硝酸甘油

B、肼屈嗪

C、硝普钠

D、硝苯地平

E、哌唑嗪

189、强心苷对哪种心衰无效【E】

A、高血压引起

B、先天性心脏病引起的

C、风湿性心脏病瓣膜病引起的

D、肺源性心脏病引起的

E、缩窄性心包炎引起的

190、下列哪种药物能增加地高辛的血药浓度【A】

A、奎尼丁

B、利多卡因

C、苯妥英钠

D、氯化钾

E、呋塞米

191、男 59 岁，约有 10 年高血压病史，经强心、利尿治疗好转，但近日病情加重，出现心慌，气短，下肢水肿加重。诊断为原发性高血压，慢性心功不全，心肌肥大，最好加用哪种药物继续治疗【A】

A、卡托普利

B、硝苯地平

C、肼屈嗪

D、哌唑嗪

E、氨茶碱

192、女 54 岁，患风湿性二尖瓣闭锁不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持疗效，但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性音，经检查左室舒张期充盈压明显升高。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗【C】

A、米力农

B、多巴胺

C、硝普钠

D、氨力农

E、卡托普利

193、女 56 岁，因风湿性心脏病给予地高辛 0.5mg/d，连续治疗一个月后，病情好转，但病人出现恶心呕吐，黄视等症状。经检查：心电图：P-R 间期和 P-T 间期延长；地高辛血浓度为 3.2ng/ml. 诊断为地高辛中毒。除立即停药外，还应采用什么药治疗【E】

A、苯妥英钠

B、利多卡因

C、普萘洛尔

D、钾盐

E、阿托品

194、具有抑制磷酸二酯酶，扩张血管和正性肌力作用的药物是【B】

A、地高辛

B、米力农

C、卡托普利

D、肼屈嗪

E、硝普钠

195、具有血管紧张素 I 转换酶抑制作用，能防止和逆转心室肥厚的药物是【C】

- A、地高辛
- B、米力农
- C、卡托普利
- D、肼屈嗪
- E、硝普钠

196、扩张小动脉，小静脉，作用强快短的扩血管药物是【E】

- A、地高辛
- B、米力农
- C、卡托普利
- D、肼屈嗪
- E、硝普钠

197、关于硝酸甘油，哪一项是错误的【C】

- A、主要扩张静脉
- B、能加快心率
- C、增加室壁张力
- D、可治疗顽固性心衰
- E、扩张冠状血管

198、硝酸甘油舒张血管平滑肌的机制是【D】

- A、激活腺苷酸环化酶，增加 cAMP
- B、直接作用于血管平滑肌
- C、激动 β_2 受体
- D、被硝酸酯受体还原成 NO 起作用

E、阻断 Ca^{2+} 通道

199、关于硝酸甘油，哪一项是错误的【B】

A、使细胞内 cGMP 增加，松弛平滑肌

B、使细胞内 cAMP 增加，松弛平滑肌

C、降低左室舒张末期压力

D、大剂量能加快心率

E、反复用药能产生耐受性

200、关于普萘洛尔抗心绞痛方面，哪项是错误的【A】

A、对变异性心绞痛效果好

B、与硝酸甘油合用效果好

C、对兼有高血压的效果好

D、久用后不宜突然停药

E、对稳定型和不稳定型的都有效

201、男 58 岁，患高血压性心脏病数年，有时因激动或过劳而发生心绞痛，最初经休息后尚可自行缓解，几天之后心绞痛加重并有心律失常，此时合理的治疗方案是【D】

A、硝酸甘油+硝酸异山梨醇

B、普萘洛尔+维拉帕米

C、地尔硫卓+普萘洛尔

D、硝酸甘油+普萘洛尔

E、地尔硫卓+维拉帕米

202、连续应用最易产生耐受性的药物是【A】

A、硝酸甘油

B、普萘洛尔

C、地尔硫卓

D、硝苯地平

E、维拉帕米

203、不宜用于变异型心绞痛的药物是【B】

A、硝酸甘油

B、普萘洛尔

C、地尔硫卓

D、硝苯地平

E、维拉帕米

204、降低总胆固醇和低密度脂蛋白最明显的药物是【D】

A、烟酸

B、多烯脂肪酸

C、普罗布考

D、乐伐他汀

E、非诺贝特

205、主要通过保护动脉内皮而发挥抗动脉粥样硬化的药物是【C】

A、多烯脂肪酸

B、考来烯胺

C、硫酸软骨素 A

D、乐伐他汀

E、吉非贝齐

206、影响胆固醇吸收的药物是【A】

A、考来烯胺

B、烟酸

C、多烯脂肪酸

D、硫酸软骨素 A

E、普罗布考

207、通过抗氧化作用而发挥抗动脉粥样硬化的药物是【E】

A、考来烯胺

B、乐伐他汀

C、烟酸

D、非诺贝特

E、普罗布考

208、HMG⁻ CoA 还原酶抑制剂是【D】

A、考来烯胺

B、烟酸

C、非诺贝特

D、乐伐他汀

E、普罗布考

209、具有抗氧化作用的药物是【E】

A、考来烯胺

B、烟酸

C、非诺贝特

D、乐伐他汀

E、普罗布考

210、抑制胆固醇合成的药物是【D】

A、考来烯胺

B、烟酸

C、非诺贝特

D、乐伐他汀

E、普罗布考

211、高血压伴有肾功不全者最好选用【C】

A、氢氯噻嗪

B、利血平

C、卡托普利

D、胍乙啶

E、哌唑嗪

212、患隐性糖尿病的高血压患者，不宜选用【B】

A、利血平

B、氢氯噻嗪

C、硝普钠

D、卡托普利

E、硝苯地平

213、高血压伴有心绞痛的病人宜选用【E】

A、卡托普利

B、硝苯地平

C、利血平

D、氢氯噻嗪

E、普萘洛尔

214、能防止，甚至逆转血管壁增厚和心肌肥大的抗高血压药是【D】

A、利尿降压药

B、 β 受体阻断药

C、钙拮抗药

D、血管紧张素转换酶抑制药

E、 α 受体阻断药

215、哪类降压药兼有改善肾功，心功，逆转心脏肥大，并能明显降低病死率【C】

A、可乐宁等中枢性降压药

B、钙拮抗剂

C、血管紧张素转换酶抑制药

D、利尿降压药

E、神经节阻断药

216、关于普萘洛尔，哪项是错误的【C】

A、阻断突触前膜 β_2 受体减少去甲肾上腺素释放

B、减少肾素的释放

C、长期用药一旦病情好转应立即停药

D、生物利用度个体差异大

E、能诱发支气管哮喘

217、卡托普利常见的不良反应是【B】

A、体位性低血压

B、刺激性干咳

C、多毛

D、阳痿

E、反射性心率加快

218、易引起首剂现象的降压药是【D】

A、卡托普利

B、利血平

C、可乐宁

D、哌唑嗪

E、硝普钠

219、抗高血压药最合理的联合是【A】

A、氢氯噻嗪+硝苯地平+普萘洛尔

B、氢氯噻嗪+拉贝洛尔+普萘洛尔

C、肼屈嗪+地尔硫卓+普萘洛尔

D、肼屈嗪+哌唑嗪+普萘洛尔

E、硝苯地平+哌唑嗪+可乐定

220、关于可乐定，哪项是错误的【C】

A、降压作用与激动延髓 I₂ 咪唑啉受体有关

B、因激动中枢 α_2 受体而出现镇静，嗜睡

C、能刺激胃肠道分泌，不宜用于有溃疡病的高血压病人

D、久用可出现水、钠潴留

E、可作为吗啡瘾者的戒毒药使用

221、关于硝普钠，哪项是错误的【E】

A、对小动脉和小静脉有同等的舒张作用

B、适用于治疗高血压危象和高血压脑病

C、也可用于治疗难治性心衰

D、连续应用数日后体内可能有 SCN^- 蓄积

E、降压作用迅速而持久

222、男，60岁，高血压病史近20年，经检查：心室肌肥厚，血压：22.6/13.3kPa.
最好选用哪种降压药【C】

- A、氢氯噻嗪
- B、可乐定
- C、卡托普利
- D、维拉帕米
- E、普萘洛尔

223、男，65岁，高血压病史18年，近日有时夜间出现胸闷，并有频发的阵发性室上性心动过速，此时宜选用【D】

- A、硝苯地平
- B、普萘洛尔
- C、心律平
- D、维拉帕米
- E、卡托普利

224、男，54岁，有胃溃疡病史，近几年因工作紧张患高血压：22/13.6kPa.问最好选用哪种降压药【B】

- A、氢氯噻嗪
- B、可乐定
- C、卡托普利
- D、硝苯地平
- E、利血平

225、女，56岁，头痛，头晕2个月，并有时心慌，经检查：血压24/14.6kPa，并有窦性心律不齐，最好选用哪种治疗方案【A】

- A、氢氯噻嗪+普萘洛尔
- B、氢氯噻嗪+可乐定
- C、硝苯地平+胍屈嗪
- D、硝苯地平+哌唑嗪

E、卡托普利+肼屈嗪

226、适用高血压伴有胃、十二指肠溃疡病人的药是【E】

A、肼屈嗪

B、硝普钠

C、依那普利

D、哌唑嗪

E、可乐定

227、适用于高血压危象的药物是【B】

A、肼屈嗪

B、硝普钠

C、依那普利

D、哌唑嗪

E、可乐定

228、因加快心率而易诱发心绞痛的药物是【A】

A、肼屈嗪

B、硝普钠

C、依那普利

D、哌唑嗪

E、可乐定

229、关于呋塞米，哪一项是错误的【C】

A、利尿作用强，同时能增加肾血流量

B、也可用于治疗高血压危象

C、利尿作用机制是抑制髓袢升支髓质段的 Na^+ 、 Cl^- 共同转运

D、不应当与氨基糖苷类抗生素同时应用

E、可用于治疗急性肾功衰竭

230、噻嗪类利尿药的作用部位是【A】

A、髓袢升支粗段皮质部

B、髓袢升支粗段髓质部

C、髓袢降支粗段皮质部

D、髓袢降支粗段髓质部

E、髓袢升支粗段全段

231、关于噻嗪类利尿药，哪项是错误的【B】

A、有降血压作用

B、利尿作用不受肾小球滤过作用的影响

C、能升高血糖

D、能升高血浆尿酸浓度

E、能抑制碳酸酐酶

232、伴有糖尿病的水肿病人，不宜选用【A】

A、氢氯噻嗪

B、呋塞米

C、氨苯蝶啶

D、螺内酯

E、乙酰唑胺

233、最易引起电解质紊乱的药物是【C】

A、氢氯噻嗪

B、螺内酯

C、呋塞米

D、氨苯蝶啶

E、乙酰唑胺

234、长期应用易使血钾升高的药物【D】

A、呋塞米

B、丁苯氧酸

C、利尿酸

D、螺内酯

E、氢氯噻嗪

235、最适于治疗肺水肿的药物是【A】

A、呋塞米

B、氢氯噻嗪

C、氨苯蝶啶

D、螺内酯

E、乙酰唑胺

236、强心苷引起的房室传导阻滞最好选用【D】

A、异丙肾上腺素

B、氯化钾

C、肾上腺素

D、阿托品

E、苯妥英钠